

Observatoire français des drogues et des toxicomanies

ORGANISME PUBLIC CHARGÉ DU RECUEIL, DE L'ANALYSE ET DE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES RELATIVES AUX DROGUES ILLICITES, À L'ALCOOL ET AU TABAC EN FRANCE

Recherche thématique

1 Produits

Alcool
Cannabis
Cocaïne et crack
Ecstasy et amphétamine
Hallucinogènes
Héroïne et autres opiacés

Médicaments psychotropes

Nouvelles drogues de synthèse
Poppers, colles, solvants
Tabac
Toutes drogues

2 Thématiques

Présentation

Production / offre
Consommation niveau et fréquence
Conséquences
Réponses publiques, lois et politiques

notice

Sélectionnez à présent la thématique que vous souhaitez obtenir pour afficher un texte de synthèse et la liste des documents relatifs à votre recherche.

3 résultat de la recherche

Médicaments psychotropes

Présentation

Légende

Article

Lettre d'information

Rapport

Base de données

Un médicament psychoactif (ou psychotrope) est prescrit par un médecin pour atténuer ou faire disparaître une souffrance psychique. Après examen, celui-ci établit un diagnostic et, s'il l'estime nécessaire, détermine le traitement adapté à l'état de santé du patient. Principalement 2 types de médicaments psychoactifs peuvent donner lieu à une utilisation détournée: les tranquillisants ou anxiolytiques: ils diminuent l'anxiété et les manifestations de l'anxiété (insomnie, tension musculaire...). Les tranquillisants les plus prescrits, notamment pour une durée longue, appartiennent à la famille des benzodiazépines, connues pour le risque de dépendances qu'elles entraînent. Les tranquillisants sont parfois utilisés de façon toxicomaniaque, à doses massives ou en association à d'autres produits.- les somnifères ou hypnotiques: ils sont destinés à provoquer et/ou maintenir le sommeil. De ce fait, ils peuvent diminuer la vigilance. Les somnifères les plus prescrits, notamment pour des durées longues, n'appartiennent pas à la famille des benzodiazépines, mais celles-ci sont encore souvent utilisées en raison de leur efficacité contre l'anxiété. les somnifères sont parfois utilisés de façon abusive, à

doses massives ou en association à d'autres produits notamment l'alcool. On distingue 3 types de toxicomanies médicamenteuses :- une escalade médicamenteuse, à l'insu du patient: face à la persistance des souffrances ou à l'apparition de nouveaux symptômes, de nouveaux médicaments sont prescrits et/ou la posologie est augmentée. Attaché à ses ordonnances, le patient ne supporte pas que le médecin supprime ou ou plusieurs produits.- une surconsommation médicamenteuse volontaire: la vie de l'utilisateur est centrée sur la consommation (avec une alternance entre des moments de consommation contrôlée et des moments de consommation excessive). Les effets recherchés peuvent englober des sensations voluptueuses ou le plaisir de fonctionner dans un état second.- la consommation médicamenteuse chez les toxicomanes à l'héroïne ou à la cocaïne: les médicaments psychoactifs viennent apporter des sensations nouvelles ou moduler les effets sédatifs ou excitants des substances consommées par ailleurs. L'association avec l'alcool est fréquente dans le cadre de ces polytoxicomanies.

Source :

Drogues et dépendances - le livre d'information, Saint-Denis, MILDT/INPES, 2006, 182 p.

Autres synthèses thématiques "Médicaments psychotropes"

- Production / offre - Consommation - niveau et fréquence - Conséquences - Réponses publiques, lois et politiques

Dernière mise à jour : mars 2010