

Observatoire français des drogues et des toxicomanies

ORGANISME PUBLIC CHARGÉ DU RECUEIL, DE L'ANALYSE ET DE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES RELATIVES AUX DROGUES ILLICITES, À L'ALCOOL ET AU TABAC EN FRANCE

Recherche thématique

1 Produits

Alcool
Cannabis
Cocaïne et crack
Ecstasy et amphétamine
Hallucinogènes
Héroïne et autres opiacés
Médicaments psychotropes
Nouvelles drogues de synthèse
Poppers, colles, solvants
Tabac
Toutes drogues

2 Thématiques

Présentation
Production / offre
Consommation niveau et fréquence
Conséquences
Réponses publiques, lois et politiques

notice

Sélectionnez à présent la thématique que vous souhaitez obtenir pour afficher un texte de synthèse et la liste des documents relatifs à votre recherche.

3 résultat de la recherche

Poppers, colles et autres solvants : conséquences

Synthèse

Légende

Article

Lettre d'information

Rapport, ouvrage

Base de données, site internet

Conséquences sanitaires : les dangers connus de la consommation de solvants

Malgré les rares données disponibles mentionnant des problèmes de santé liés au poppers, colles et autres solvants (de rares décès par surdose de solvants rapportés par les forces de l'ordre jusqu'en 1999, et environ 80 séjours hospitaliers par an directement liés à l'utilisation des solvants entre 2000 et 2002 [1]), la toxicité de ces produits ne doit pas être négligée.

Effectivement, des accidents peuvent survenir lors de la prise des solvants : asphyxie par perte de connaissance « la tête dans le sac », explosion par chauffage de solvants volatils, arrêt cardiaque, expériences d'hallucinations, etc. L'usage à long terme entraîne des pathologies neurologiques, des lésions des reins, du foie, des voies respiratoires et du

système digestif, ainsi que des troubles du comportement [2].

L'intoxication au poppers peut provoquer des nausées, des vomissements, une hypotension, une dermite de contact (lésions nasales et du visage), des céphalées et parfois la survenue d'une anémie par altération des globules rouges (méthémoglobinémie). Elle peut aussi se traduire par une psychose aiguë et rarement par un coma ou un décès. L'association à certains médicaments, dont le Viagra qui y est souvent associé par une frange des consommateurs, potentialise les risques d'accidents cardiovasculaires. De 1992 à 2000, 310 intoxications aiguës ont été rapportées [3].

Sélection de documents

1. Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, Programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI)

2. Richard, D., J.-L. Senon, and M. Valleur, Dictionnaire des drogues et des dépendances. 2ème ed.

2004, Paris, Larousse, coll. In Extenso, 626 p.

3. CADET-TAIROU A. et al, Drogues et usages de drogues en France : Etat des lieux et tendances récentes 2007-2009 - Neuvième rapport national du dispositif TREND

Paris, OFDT, 2010, 281 p.

Dernière mise à jour : décembre 2010