


Données récentes relatives aux traitements de substitution aux opiacés



Tendances n° 65, OFDT, 6 p. Mai 2009

On estime à 120 000 le nombre de personnes traitées par Médicaments de substitution aux opiacés (MSO) en 2007 avec – spécificité française – une nette prédominance de la Buprénorphine haut dosage (BHD) représentant 80 % de l'ensemble. Si l'impact de ces MSO auprès des personnes dépendantes aux opiacés est clairement très positif près de 15 ans après leur mise sur le marché, des mésusages ont aussi pu voir le jour, rendant nécessaire un suivi de la prescription de ces produits. C'est dans ce contexte qu'une coopération entre la CNAMTS et l'OFDT s'est mise en place, l'étude présentée ici en constituant le troisième volet. Il se base pour la première fois non plus sur des sites régionaux mais sur l'ensemble du territoire à partir de deux échantillons représentatifs de bénéficiaires du régime général de l'Assurance maladie tirés au sort pour les années 2006 et 2007. L'étude s'attache à décrire les modalités de consommation des MSO sur ces deux années (niveaux de consommation, associations médicamenteuses) mais approche aussi, à travers notamment les durées de traitement, l'intentionnalité de leurs usages (thérapeutique ou non) et précise, le cas échéant, les abus ou détournements rencontrés.

Auteurs : Tiphaine Canarelli, Anaëlle Coquelin

 Télécharger le fichier PDF (150 Ko)

de la prise en charge globale de l'Assurance maladie et celle de son suivi à travers les années 2006 et 2007. Elle cherche à décrire les modalités de consommation des MSO sur ces deux années (niveaux de consommation, associations médicamenteuses) mais approche aussi, à travers notamment les durées de traitement, l'intentionnalité de leurs usages (thérapeutique ou non) et précise, le cas échéant, les abus ou détournements rencontrés.

Méthodes

Des échantillons de personnes dépendantes de l'addiction aux opiacés ont été tirés au sort en 2006 et en 2007, par région administrative, pour les bénéficiaires du régime général de l'Assurance maladie. Le tirage a été effectué en respectant les modalités de l'étude de l'Assurance maladie tirés au sort pour les années 2006 et 2007. Les personnes dépendantes de l'addiction aux opiacés ont été tirées au sort à partir de la liste des personnes dépendantes de l'addiction aux opiacés établie par les services régionaux de l'Assurance maladie en 2006 et 2007. Les personnes dépendantes de l'addiction aux opiacés ont été tirées au sort à partir de la liste des personnes dépendantes de l'addiction aux opiacés établie par les services régionaux de l'Assurance maladie en 2006 et 2007.

1. BHD (Buprénorphine haut dosage) et BHD (Buprénorphine haut dosage) en France par région administrative, 2006 et 2007. 2. BHD (Buprénorphine haut dosage) en France par région administrative, 2006 et 2007. 3. BHD (Buprénorphine haut dosage) en France par région administrative, 2006 et 2007.