



Pôle « indicateurs »

## **RECAP**

*(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)*

# **Tableaux statistiques**

---

## **Présentation de RECAP**

### **Objectif du recueil**

RECAP est un recueil de données continu conçu pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation de l'offre de soins. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

### **Modalités du recueil**

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT. Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

### **Critères d'inclusion**

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. Ces personnes doivent pouvoir être considérées comme engagées ou cherchant à s'engager dans un processus d'accompagnement et de soins. Elles sont physiquement présentes sur le lieu de consultation. Les personnes appartenant à l'entourage d'un consommateur ou celles venues uniquement pour obtenir de l'information ou encore celles qui ne font que passer pour chercher du matériel de réduction des risques ne doivent pas être incluses. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont en revanche incluses dans le recueil.

### **Couverture du recueil**

En 2014, environ 169 600 patients vus dans 250 CSAPA ambulatoires distincts, 10 centres thérapeutiques résidentiels et 5 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête.

## Informations recueillies

1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques des personnes prises en charge
2. Prise en charge
3. Produits consommés
4. Mode, fréquence, type et durée de consommation des produits
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

## Répartition en groupes

Parmi les personnes accueillies dans les CSAPA trois populations se distinguent, avec un premier groupe qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 37 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne. Un deuxième groupe est constitué de personnes dont l'âge moyen est 26 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis alors que le troisième groupe comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 43 ans et qui ont un problème avec l'alcool. A partir des données RECAP de l'année 2014, les personnes accueillies en raison d'un problème d'addiction sans substances ne sont plus incluses dans le groupe opiacés, cocaïne et autres produits. La croissance des effectifs de cette catégorie de personnes qui présentent des profils spécifiques tendait à modifier artificiellement certaines caractéristiques des usagers d'opiacés ou de cocaïne. Les données moyennes calculées sur l'ensemble des trois catégories principales d'usagers (d'opiacés et de cocaïne, de cannabis et d'alcool) ont une signification limitée. Les caractéristiques qui se dégagent et leurs évolutions dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il est plus pertinent de décrire les caractéristiques spécifiques de chacune de ces trois populations.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « groupe cannabis », le deuxième par « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** », et le troisième par « **groupe alcool** ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le critère d'inclusion dans le « groupe alcool, tabac » est que l'alcool ou le tabac soient cités comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que l'alcool ou le tabac comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie des deux groupes précédents et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Il peut être noté que les personnes de ce groupe peuvent être consommatrices de cannabis soit parce que cette substance est mentionnée en produit autre que le produit n°1, soit pour des personnes ayant un produit autre que le cannabis à l'origine de la prise en charge et/ou suivant un traitement de substitution aux opiacés.

L'information sur les produits ou sur les addictions est absente pour environ 10 % des personnes vues dans les CSAPA.

Pour le détail des questions RECAP, pour consulter le guide du questionnaire RECAP, le protocole européen d'enregistrement des demandes de traitement, voir les documents en ligne consultable à l'adresse :

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2014/OFDT

**1. Nombre et caractéristiques socio – démographiques des personnes prises en charge**
**Tableau 1 - Nombre de personnes incluses dans RECAP en 2014**

	N	%
1. Groupe cannabis	29 328	19,6
2. Groupe opiacés, cocaïne, autres produits	43 729	29,2
3. Groupe alcool	73 222	49,0
4. Groupe addictions sans substances	3 303	2,2
Total avec produits ou addictions connues	149 582	100,0
Sans informations sur les produits ou addictions	20 053	11,8
Total général	169 635	100,0

**Tableau 2 - Répartition par sexe**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Homme	25 054	85,6	33 828	77,4	55 790	76,4
Femme	4 226	14,4	9 877	22,6	17 281	23,6
Total réponses "utiles" Sexe	29 280	100,0	43 705	100,0	73 071	100,0
Taux de réponse		99,8		99,9		99,8

**Tableau 3 - Age (moyenne et médiane)**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
	29 103		43 546		72 709	
moyenne	26,0		37,0		43,8	
écart-type	8,9		9,5		12,8	
médiane	24,0		36,0		44,0	

**Tableau 4 - Répartition par âge**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Moins de 20 ans	7 993	27,5	538	1,2	1 696	2,3
Dont moins de 18 ans	3 912	13,4	202	0,5	823	1,1
De 20 à 24 ans	7 454	25,6	2 878	6,6	3 302	4,5
De 25 à 29 ans	5 456	18,7	6 958	16,0	5 755	7,9
De 30 à 39 ans	5 538	19,0	16 214	37,2	16 230	22,3
De 40 à 49 ans	2 029	7,0	12 586	28,9	21 239	29,2
De 50 à 59 ans	553	1,9	3 833	8,8	16 134	22,2
Plus de 60 ans	80	0,3	539	1,2	8 353	11,5
Total réponses "utiles" Age	29 103	100,0	43 546	100,0	72 709	100,0
Taux de réponse		99,2		99,6		99,3

**Tableau 5 - Répartition suivant le nombre d'enfants**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Sans enfant	22 111	79,2	22 667	55,1	27 733	39,3
1 enfant	2 873	10,3	8 873	21,6	13 771	19,5
2 enfants ou plus	2 947	10,6	9 583	23,3	29 122	41,2
Total réponses "utiles" Nb enfants	27 931	100,0	41 123	100,0	70 626	100,0
Taux de réponse		95,2		94,0		96,5

**Tableau 6 - Répartition suivant la CSP**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Agriculteur	148	0,6	256	0,7	1 064	1,7
Artisan commerçant	653	2,7	1 329	3,5	3 378	5,4
Cadre Prof Libérale	336	1,4	832	2,2	3 357	5,4
Profession intermédiaire	411	1,7	980	2,6	2 599	4,2
Employé	5 649	23,3	10 575	28,1	21 161	34,1
Ouvrier	5 237	21,6	10 663	28,3	15 731	25,4
Retraité	55	0,2	246	0,7	3 919	6,3
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	11 720	48,4	12 747	33,9	10 800	17,4
Total réponses "utiles" CSP	24 209	100,0	37 628	100,0	62 009	100,0
Taux de réponse		82,5		86,0		84,7

**Tableau 7 - Répartition suivant l'entourage**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Vit seul	5 361	19,3	14 580	35,2	25 897	36,9
Vit avec ses parents	13 229	47,6	7 506	18,1	8 376	11,9
Vit seul(e) avec enfant(s)	610	2,2	1 956	4,7	3 936	5,6
Vit avec un conjoint seulement	2 373	8,5	5 704	13,8	12 336	17,6
Vit avec conjoint et enfant(s)	2 905	10,4	6 025	14,6	13 321	19,0
Vit avec des amis	606	2,2	1 494	3,6	1 364	1,9
Vit en établissement pénitentiaire	210	0,8	418	1,0	395	0,6
Autre	2 507	9,0	3 723	9,0	4 591	6,5
Total réponses "utiles" Entourage	27 801	100,0	41 406	100,0	70 216	100,0
Taux de réponse		94,8		94,7		95,9

**Tableau 8 - Répartition suivant le logement**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Durable indépendant	11 060	40,4	22 452	54,2	52 199	74,6
Durable chez des proches	12 412	45,3	7 533	18,2	7 859	11,2
Durable en institution	436	1,6	693	1,7	1 154	1,7
Provisoire chez des proches	1 204	4,4	2 850	6,9	2 765	4,0
Provisoire en institution	1 097	4,0	2 331	5,6	2 434	3,5
Autre Provisoire	611	2,2	1 952	4,7	1 615	2,3
Etablissement pénitentiaire	257	0,9	1 374	3,3	483	0,7
SDF	298	1,1	2 212	5,3	1 426	2,0
Total réponses "utiles" Logement	27 375	100,0	41 397	100,0	69 935	100,0
Taux de réponse		93,3		94,7		95,5

**Tableau 9 - Répartition suivant l'origine des ressources**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Revenus d'emplois	8 877	33,0	13 037	32,5	34 661	50,9
Retraites ou pensions d'invalidité	65	0,2	564	1,4	1 847	2,7
ASSEDIC	2 450	9,1	4 477	11,2	7 985	11,7
RSA	2 512	9,3	9 222	23,0	9 772	14,3
AAH	737	2,7	3 846	9,6	3 925	5,8
Autres prestations sociales	456	1,7	1 270	3,2	1 440	2,1
Ressources provenant d'un tiers	7 477	27,8	3 055	7,6	2 984	4,4
Autres ressources (y compris sans revenus)	4 327	16,1	4 653	11,6	5 545	8,1
Total réponses "utiles" Origine des ressources	26 901	100,0	40 124	100,0	68 159	100,0
Taux de réponse		91,7		91,8		93,1

**Tableau 10 - Répartition suivant la situation professionnelle**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Activité rémunérée continue	5 863	21,5	9 435	23,9	25 920	38,6
CDD de plus de 6 mois	613	2,2	1 047	2,7	638	0,9
Activité rémunérée intermittente	3 052	11,2	4 478	11,4	4 476	6,7
Chômage	5 289	19,4	10 687	27,1	14 905	22,2
Etudiant, élève, stage non rémunéré	7 175	26,3	1 135	2,9	2 056	3,1
Retraité	34	0,1	229	0,6	5 368	8,0
Autre inactif	5 247	19,2	12 384	31,4	13 873	20,6
Total réponses "utiles" Situation Professionnelle	27 273	100,0	39 395	100,0	67 236	100,0
Taux de réponse		93,0		90,1		91,8

**Tableau 11 - Répartition suivant le niveau d'étude**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Pas terminé le primaire	162	0,7	314	0,9	574	1,1
Niveau primaire	774	3,3	1 730	5,1	2 577	4,8
Niveau BEPC	5 134	21,6	5 795	17,1	7 792	14,6
Niveau BEP, CAP	9 406	39,7	15 783	46,6	23 307	43,8
Niveau Bac	5 760	24,3	5 982	17,7	8 386	15,7
Niveau Bac+2	1 473	6,2	2 378	7,0	5 253	9,9
Niveau au-delà Bac+2	1 006	4,2	1 900	5,6	5 360	10,1
Total réponses "utiles" Niveau scolaire	23 715	100,0	33 882	100,0	53 249	100,0
Taux de réponse		80,9		77,5		72,7

## 2. Origine et ancienneté de la prise en charge

**Tableau 12 - Répartition suivant l'origine de la prise en charge**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Le patient lui-même	5 910	24,9	21 678	53,7	23 889	40,5
Les proches (familles/amis)	2 785	11,7	2 819	7,0	3 997	6,8
Médecin de ville	918	3,9	3 690	9,1	6 816	11,5
CSAPA, assimilé	167	0,7	2 969	7,3	739	1,3
Structures de RDR	86	0,4	490	1,2	250	0,4
Structure spécialisée en alcoologie	96	0,4	350	0,9	1 988	3,4
Equipe de liaison	168	0,7	757	1,9	2 710	4,6
Autre hôpital/autre sanitaire	979	4,1	2 224	5,5	6 058	10,3
Institutions et services soc	1 245	5,2	1 182	2,9	3 415	5,8
Obligation de soins	4 364	18,4	2 009	5,0	4 928	8,3
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencielle	1 360	5,7	694	1,7	830	1,4
Classement avec orientation	2 659	11,2	361	0,9	1 081	1,8
Autre mesure judiciaire ou administrative	1 639	6,9	257	0,6	231	0,4
Milieu scolaire/universitaire	906	3,8	160	0,4	617	1,0
Autre	461	1,9	758	1,9	1 490	2,5
Total réponses "utiles" Origine de la PEC	23 743	100,0	40 398	100,0	59 039	100,0
Taux de réponse		81,0		92,4		80,6

**Tableau 13 - Répartition suivant l'existence de prise en charge antérieures**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Jamais été pris en charge	12 304	71,6	8 918	28,9	11 851	42,2
Suivi actuellement	3 728	21,7	10 470	34,0	10 520	37,4
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	1 161	6,8	11 438	37,1	5 738	20,4
Total réponses "utiles" PEC antérieure	17 193	100,0	30 826	100,0	28 109	100,0
Taux de réponse		58,6		70,5		38,4

**Tableau 14 - Répartition suivant l'année de la première prise en charge**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Cette année	2 723	47,0	2 672	14,0	3 975	28,9
Un à deux ans auparavant	1 517	26,2	3 666	19,3	3 564	25,9
Trois à cinq ans auparavant	878	15,2	4 483	23,6	2 717	19,7
plus de 5 ans auparavant	676	11,7	8 209	43,1	3 515	25,5
Total réponses "utiles" Année de la première PEC	5 794	100,0	19 030	100,0	13 771	100,0
Taux de réponse		19,8		43,5		18,8

### 3. Produits utilisés, modes et fréquences de consommation des personnes prises en charge

**Tableau 15 - Répartition suivant le nombre de produits consommés dans le mois passé**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Un seul produit	13 968	50,9	12 049	31,6	34 195	49,8
2 produits	8 234	30,0	11 093	29,1	25 756	37,5
3 produits	4 359	15,9	8 796	23,1	7 110	10,4
4 produits et plus	867	3,2	6 163	16,2	1 596	2,3
Total réponses "utiles" nombre de produits	27 428	100,0	38 101	100,0	68 657	100,0
Taux de réponse		93,5		87,1		93,8

**Tableau 16 - Répartition suivant les produits consommés, quel que soit le rang de citation du produit**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool	7 127	25,6	12 115	30,7	62 813	90,2
Tabac	15 346	55,1	24 029	60,8	42 778	61,4
Cannabis	27 564	98,9	17 216	43,6	11 948	17,2
Benzodiazépines	145	0,5	2 993	7,6	733	1,1
GHB/GBL	7	0,0	103	0,3	32	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants	53	0,2	598	1,5	129	0,2
Antidépresseurs	27	0,1	274	0,7	85	0,1
Barbituriques	6	0,0	138	0,3	16	0,0
Héroïne	537	1,9	19 390	49,1	1 208	1,7
Autres opiacés	58	0,2	2 765	7,0	145	0,2
Buprénorphine haut dosage	79	0,3	4 439	11,2	176	0,3
Méthadone	45	0,2	3 303	8,4	94	0,1
Fentanyl	6	0,0	154	0,4	38	0,1
Cocaïne	1 371	4,9	9 398	23,8	2 031	2,9
Crack	87	0,3	1 601	4,1	157	0,2
Autres dérivés cocaïne	16	0,1	45	0,1	18	0,0
MDMA et dérivés	420	1,5	958	2,4	167	0,2
Amphétamines	225	0,8	912	2,3	153	0,2
Méthamphétamines	54	0,2	107	0,3	99	0,1
Cathinones synthétiques	-	-	134	0,3	7	0,0
Autres stimulants	19	0,1	251	0,6	30	0,0
LSD	246	0,9	693	1,8	133	0,2
Champignons	79	0,3	78	0,2	41	0,1
Ketamine	39	0,1	216	0,5	55	0,1
Autres hallucinogènes	39	0,1	216	0,5	55	0,1
Colles et solvants	31	0,1	131	0,3	21	0,0
Autres produits	246	0,9	959	2,4	311	0,4
Jeux d'argent	116	0,4	75	0,2	322	0,5
Cyberaddiction	82	0,3	43	0,1	61	0,1
Trouble léger du comportement alimentaire	51	0,2	83	0,2	261	0,4
Autre addiction sans produit	73	0,3	68	0,2	144	0,2
Pas de produit consommé	1 464	5,0	1 860	4,3	3 604	4,9
Total réponses "utiles" Produits	27 864	199,5	39 518	266,1	69 618	183,4
Taux de réponse		95,0		90,4		95,1

Tableau 17 - Répartition suivant le produit à l'origine de la prise en charge (ou produit 1 si pas de produit à l'origine de la prise en charge)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool	-	-	2 818	6,9	64 990	88,8
Tabac	-	-	409	1,0	5 990	8,2
Cannabis	29 328	100,0	1 403	3,4	1 398	1,9
Benzodiazépines	-	-	905	2,2	38	0,1
GHB_GBL	-	-	19	0,0	1	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants	-	-	279	0,7	14	0,0
Antidépresseurs	-	-	109	0,3	5	0,0
Barbituriques	-	-	57	0,1	7	0,0
Héroïne	-	-	22 261	54,4	347	0,5
Autres opiacés	-	-	2 271	5,6	39	0,1
Buprénorphine haut dosage	-	-	3 205	7,8	36	0,0
Méthadone	-	-	1 780	4,4	27	0,0
Fentanyl	-	-	108	0,3	3	0,0
Cocaïne	-	-	2 834	6,9	135	0,2
Crack	-	-	814	2,0	21	0,0
Derives de la cocaïne	-	-	28	0,1	3	0,0
MDMA et dérivés	-	-	163	0,4	9	0,0
Cathinones synthétiques	-	-	33	0,1	-	-
Amphétamines	-	-	249	0,6	21	0,0
Methamphetamines	-	-	8	0,0	-	-
Autres stimulants	-	-	76	0,2	14	0,0
LSD	-	-	122	0,3	12	0,0
Champignons	-	-	10	0,0	1	0,0
Ketamine	-	-	52	0,1	6	0,0
Autres hallucinogènes	-	-	53	0,1	2	0,0
Colles et solvants	-	-	60	0,1	2	0,0
Autres produits	-	-	764	1,9	25	0,0
Jeux d'argent	-	-	2	0,0	35	0,0
Cyberaddiction	-	-	-	-	3	0,0
Trouble léger du comportement alimentaire	-	-	-	-	19	0,0
Autre addiction sans produit	-	-	2	0,0	19	0,0
Total réponses "utiles" Produits	29 328	100,0	40 894	100,0	73 222	100,0
Taux de réponse		100,0		93,5		100,0

Tableau 18 - Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (produit 1)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool 1	-	-	3 664	9,6	60 424	88,0
Tabac 1	-	-	1 229	3,2	8 233	12,0
Cannabis 1	27 428	100,0	3 502	9,2	-	-
Benzodiazépines 1	-	-	1 109	2,9	-	-
GHB_GBL1	-	-	26	0,1	-	-
Autres hypnot. et tranquillisants 1	-	-	288	0,8	-	-
Antidépresseurs 1	-	-	112	0,3	-	-
Barbituriques 1	-	-	49	0,1	-	-
Héroïne 1	-	-	15 883	41,7	-	-
Autres opiacés 1	-	-	2 016	5,3	-	-
Buprénorphine haut dosage 1	-	-	2 750	7,2	-	-
Méthadone 1	-	-	1 749	4,6	-	-
Fentanyl1	-	-	80	0,2	-	-
Cocaïne 1	-	-	3 132	8,2	-	-
Crack 1	-	-	885	2,3	-	-
Derives de la cocaïne 1	-	-	23	0,1	-	-
MDMA et dérivés 1	-	-	173	0,5	-	-
Cathinones synthétiques 1	-	-	34	0,1	-	-
Amphétamines 1	-	-	284	0,7	-	-
Methamphetamines 1	-	-	4	0,0	-	-
Autres stimulants 1	-	-	93	0,2	-	-
LSD 1	-	-	126	0,3	-	-
Champignons 1	-	-	12	0,0	-	-
Ketamine 1	-	-	70	0,2	-	-
Autres hallucinogènes 1	-	-	59	0,2	-	-
Colles et solvants 1	-	-	53	0,1	-	-
Autres produits 1	-	-	695	1,8	-	-
Jeux d'argent 1	-	-	-	-	-	-
Cyberaddictions 1	-	-	-	-	-	-
Trouble léger du comportement alimentaire 1	-	-	-	-	-	-
Autre addiction sans produit 1	-	-	-	-	-	-
Total réponses "utiles" Produit 1	27 428	100,0	38 100	100,0	68 657	100,0
Taux de réponse		93,5		87,1		93,8
Pas de produit consommé 1	944	3,2	2 429	5,6	2 425	3,3

**Tableau 19 - Répartition suivant le deuxième produit consommé**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool 2	4 628	34,1	4 425	16,9	1 937	5,6
Tabac 2	7 115	52,4	3 959	15,2	22 897	65,8
Cannabis 2	-	-	6 735	25,8	7 181	20,6
Benzodiazépines 2	60	0,4	894	3,4	421	1,2
GHB_GBL2	1	0,0	23	0,1	2	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants 2	16	0,1	184	0,7	57	0,2
Antidépresseurs 2	12	0,1	92	0,4	61	0,2
Barbituriques 2	4	0,0	41	0,2	7	0,0
Héroïne 2	244	1,8	2 177	8,3	426	1,2
Autres opiacés 2	26	0,2	484	1,9	99	0,3
Buprénorphine haut dosage 2	41	0,3	986	3,8	87	0,3
Méthadone 2	16	0,1	968	3,7	51	0,1
Fentanyl 2	1	0,0	21	0,1	5	0,0
Cocaïne 2	674	5,0	3 630	13,9	699	2,0
Crack 2	42	0,3	382	1,5	70	0,2
Dérives de la cocaïne 2	10	0,1	11	0,0	11	0,0
MDMA et dérivés 2	171	1,3	220	0,8	44	0,1
Amphétamines 2	63	0,5	246	0,9	33	0,1
Méthamphétamines 2	2	0,0	7	0,0	-	-
Cathinones synthétiques 2	-	-	72	0,3	2	0,0
Autres stimulants 2	7	0,1	60	0,2	15	0,0
LSD 2	87	0,6	134	0,5	21	0,1
Champignon 2	20	0,1	17	0,1	3	0,0
Ketamine 2	19	0,1	72	0,3	15	0,0
Autres hallucinogènes 2	9	0,1	36	0,1	29	0,1
Colles et solvants 2	14	0,1	37	0,1	7	0,0
Autres produits 2	143	1,1	111	0,4	165	0,5
Jeux d'argent 2	49	0,4	23	0,1	171	0,5
Cyberaddiction 2	38	0,3	15	0,1	29	0,1
Trouble léger du comportement alimentaire 2	24	0,2	31	0,1	171	0,5
Autre addiction sans produit 2	43	0,3	28	0,1	80	0,2
Total réponses "utiles" Produit 2	13 579	100,0	26 121	100,0	34 796	100,0
Taux de réponse		46,3		59,7		47,5
Pas de produit consommé 2	2 380	8,1	2 883	6,6	8 197	11,2

**Tableau 20 - Répartition suivant le troisième produit consommé**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool 3	2 335	43,6	2 601	17,3	432	4,8
Tabac 3	1 589	29,7	3 022	20,1	2 441	27,0
Cannabis 3	-	-	3 679	24,5	3 942	43,6
Benzodiazépines 3	50	0,9	616	4,1	221	2,4
GHB_GBL 3	5	0,1	33	0,2	21	0,2
Autres hypnot. et tranquillisants 3	20	0,4	74	0,5	50	0,6
Antidépresseurs 3	9	0,2	48	0,3	14	0,2
Barbituriques 3	2	0,0	33	0,2	6	0,1
Héroïne 3	191	3,6	893	5,9	455	5,0
Autres opiacés 3	21	0,4	152	1,0	28	0,3
Buprénorphine haut dosage 3	23	0,4	436	2,9	47	0,5
Méthadone 3	15	0,3	366	2,4	22	0,2
Fentanyl 3	5	0,1	37	0,2	25	0,3
Cocaïne 3	472	8,8	1 697	11,3	736	8,1
Crack 3	25	0,5	204	1,4	50	0,6
Dérives de la cocaïne 3	3	0,1	8	0,1	4	0,0
MDMA et dérivés 3	131	2,4	296	2,0	50	0,6
Amphétamines 3	92	1,7	203	1,4	49	0,5
Méthamphétamines 3	31	0,6	38	0,3	23	0,3
Cathinones synthétiques 3	-	-	21	0,1	5	0,1
Autres stimulants 3	9	0,2	55	0,4	4	0,0
LSD 3	79	1,5	201	1,3	26	0,3
Champignon 3	28	0,5	19	0,1	9	0,1
Ketamine 3	10	0,2	38	0,3	4	0,0
Autres hallucinogènes 3	11	0,2	83	0,6	10	0,1
Colles et solvants 3	13	0,2	17	0,1	7	0,1
Autres produits 3	66	1,2	82	0,5	96	1,1
Jeux d'argent 3	46	0,9	26	0,2	116	1,3
Cyberaddiction 3	37	0,7	14	0,1	22	0,2
Trouble léger du comportement alimentaire 3	18	0,3	26	0,2	73	0,8
Autre addiction sans produit 3	16	0,3	17	0,1	48	0,5
Total réponses "utiles" Produit 3	5 352	100,0	15 035	100,0	9 036	100,0
Taux de réponse		18,2		34,4		12,3
Pas de produit consommé 3	1 239	4,2	2 408	5,5	3 212	4,4



**Tableau 21 - Nb moyen de cigarettes/j pour les fumeurs quotidiens**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
moyenne	11 831		22 358		28 544	
écart-type	12,1		16,8		18,2	
médiane	7,8		8,8		10,4	
	10,0		15,0		20,0	

**Tableau 22 - Répartition des fumeurs quotidiens suivant le nombre de cigarette/j**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
1 à 9 cigarettes	3 901	33,0	2 760	12,3	3 888	13,6
10 à 19 cigarettes	4 954	41,9	8 698	38,9	9 402	32,9
20 à 39 cigarettes	2 777	23,5	9 924	44,4	13 345	46,8
plus de 40 cigarettes	199	1,7	976	4,4	1 909	6,7
Total réponses "utiles" Nb de cigarettes	11 831	100,0	22 358	100,0	28 544	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		77,1		93,0		66,7

**Tableau 23 - Nb moyen de joints/j pour les fumeurs quotidiens de cannabis**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
moyenne	9 102		8 064		2 510	
écart-type	5,8		4,3		4,9	
médiane	5,5		4,6		5,1	
	4,0		3,0		3,0	

**Tableau 24 - Répartition des fumeurs de cannabis quotidiens suivant le nombre de joints/j**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
1 à 3 joints	3 946	43,4	4 838	60,0	1 389	55,3
4 à 6 joints	2 546	28,0	1 850	22,9	562	22,4
7 joints et plus	2 610	28,7	1 376	17,1	559	22,3
Total réponses "utiles" Nb de joints	9 102	100,0	8 064	100,0	2 510	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		33,0		46,8		21,0

#### 4. Modes, fréquences, types, délai de consommation suivant le produit posant le plus de problèmes

**Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>			<b>3 664</b>		<b>60 424</b>	
<b>Fréquence de consommation</b>						
Pas plus d'une fois au cours des 30 derniers jours			249	7,2	7 569	13,9
1 fois/sem ou moins			186	5,4	6 125	11,2
2 à 3 fois/semaine			333	9,6	3 761	6,9
4 à 6 fois/semaine			268	7,7	9 067	16,6
Chaque jour			2 436	70,2	28 007	51,4
Total réponses "utiles" Fréquence Alcool			3 472	100,0	54 529	100,0
Taux de réponse				94,8		90,2
<b>Usage/dépendance</b>						
Usage à risque			275	8,6	4 068	8,4
Usage nocif			576	17,9	14 037	29,1
Dépendance			2 358	73,5	30 145	62,5
Total réponses "utiles" Usage Alcool			3 209	100,0	48 250	100,0
Taux de réponse				87,6		79,9
<b>Début d'alcoolisation</b>						
Moins de 5 ans			120	4,9	1 491	4,6
5-14 ans			562	23,1	7 095	21,7
15-19 ans			467	19,2	4 374	13,4
20-24 ans			419	17,2	4 583	14,0
25 ans et plus			864	35,5	15 106	46,3
Total réponses "utiles" Début Alcool 1			2 432	100,0	32 649	100,0
Taux de réponse				66,4		

**Tableau 26 - Répartition des personnes pour lesquelles le cannabis est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>	<b>27 428</b>		<b>3 502</b>			
<i>Mode de consommation</i>						
Injecté	-	-	-	-		
Fumé/inhalé	25 939	99,3	3 311	98,9		
Mangé/bu	171	0,7	38	1,1		
Sniffé	-	-	-	-		
Autres	21	0,1	-	-		
Total réponses "utiles" Mode conso Cannabis	26 131	100,0	3 349	100,0		
Taux de réponse		95,3		95,6		
<i>Fréquence de consommation</i>						
1 fois dans le mois	2 872	11,2	336	10,1		
1 fois/sem ou moins	2 318	9,0	303	9,1		
2 à 3 fois/semaine	2 728	10,6	473	14,2		
4 à 6 fois/semaine	2 046	8,0	177	5,3		
Chaque jour	15 677	61,1	2 053	61,4		
Total réponses "utiles" Fréquence Cannabis	25 641	100,0	3 342	100,0		
Taux de réponse		93,5		95,4		
<i>Usage/dépendance</i>						
Usage à risque	3 967	17,5	516	16,6		
Usage nocif	5 791	25,5	804	25,9		
Dépendance	12 970	57,1	1 781	57,4		
Total réponses "utiles" Usage Cannabis	22 728	100,0	3 101	100,0		
Taux de réponse		82,9		88,5		
<i>Début de la consommation</i>						
Moins d'un an	230	1,0	8	0,3		
1 à 5 ans	6 466	29,4	88	3,1		
5 à 10 ans	5 967	27,1	268	9,4		
10 ans et plus	9 319	42,4	2 498	87,3		
Total réponses "utiles" Début Cannabis	21 982	100,0	2 862	100,0		
Taux de réponse		80,1		81,7		

**Tableau 27 - Répartition des personnes pour lesquelles les benzodiazépines sont les produits posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>			<b>1 109</b>			
<i>Mode de consommation</i>						
Injecté			16	1,6		
Fumé/inhalé			-	-		
Mangé/bu			944	93,7		
Sniffé			15	1,5		
Autres			33	3,3		
Total réponses "utiles" Mode conso Benzodiazépine			1 008	100,0		
Taux de réponse				90,9		
<i>Fréquence de consommation</i>						
1 fois dans le mois			53	5,0		
1 fois/sem ou moins			25	2,4		
2 à 3 fois/semaine			57	5,4		
4 à 6 fois/semaine			26	2,5		
Chaque jour			893	84,7		
Total réponses "utiles" Fréquence Benzodiazépine			1 054	100,0		
Taux de réponse				95,0		
<i>Usage/dépendance</i>						
Usage à risque			43	4,4		
Usage nocif			114	11,5		
Dépendance			831	84,1		
Total réponses "utiles" Usage Benzodiazépine			988	100,0		
Taux de réponse				89,1		
<i>Début de la consommation</i>						
Moins d'un an			6	0,9		
1 à 5 ans			82	11,9		
5 à 10 ans			137	19,8		
10 ans et plus			466	67,4		
Total réponses "utiles" Début Benzodiazépine			691	100,0		
Taux de réponse				62,3		

**Tableau 28 - Répartition des personnes pour lesquelles l'héroïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>15 883</b>	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		3 004	20,6
Fumé/inhalé		2 545	17,5
Mangé/bu		172	1,2
Sniffé		8 722	59,9
Autres		114	0,8
Total réponses "utiles" Mode conso Héroïne		14 557	100,0
Taux de réponse			91,7
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		1 997	13,8
1 fois/sem ou moins		1 278	8,8
2 à 3 fois/semaine		1 391	9,6
4 à 6 fois/semaine		944	6,5
Chaque jour		8 896	61,3
Total réponses "utiles" Fréquence Héroïne		14 506	100,0
Taux de réponse			91,3
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		789	6,4
Usage nocif		828	6,8
Dépendance		10 633	86,8
Total réponses "utiles" Usage Héroïne		12 250	100,0
Taux de réponse			77,1
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		56	0,4
1 à 5 ans		1 283	10,3
5 à 10 ans		3 145	25,2
10 ans et plus		8 012	64,1
Total réponses "utiles" Début Héroïne		12 496	100,0
Taux de réponse			78,7

**Tableau 29 - Répartition des personnes pour lesquelles la méthadone est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>1 749</b>	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		35	2,2
Fumé/inhalé		24	1,5
Mangé/bu		1 484	92,7
Sniffé		36	2,2
Autres		22	1,4
Total réponses "utiles" Mode conso Méthadone		1 601	100,0
Taux de réponse			91,5
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		30	1,8
1 fois/sem ou moins		22	1,3
2 à 3 fois/semaine		61	3,7
4 à 6 fois/semaine		59	3,6
Chaque jour		1 463	89,5
Total réponses "utiles" Fréquence Méthadone		1 635	100,0
Taux de réponse			93,5
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		66	4,4
Usage nocif		40	2,6
Dépendance		1 408	93,0
Total réponses "utiles" Usage Méthadone		1 514	100,0
Taux de réponse			86,6
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		65	6,0
1 à 5 ans		358	33,0
5 à 10 ans		328	30,3
10 ans et plus		333	30,7
Total réponses "utiles" Début Méthadone		1 084	100,0
Taux de réponse			62,0

**Tableau 30 - Répartition des personnes pour lesquelles la BHD est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>2 750</b>	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		736	28,9
Fumé/inhalé		103	4,0
Mangé/bu		985	38,6
Sniffé		658	25,8
Autres		69	2,7
Total réponses "utiles" Mode conso BHD		2 551	100,0
Taux de réponse			92,8
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		69	2,7
1 fois/sem ou moins		54	2,1
2 à 3 fois/semaine		128	4,9
4 à 6 fois/semaine		139	5,3
Chaque jour		2 213	85,0
Total réponses "utiles" Fréquence BHD		2 603	100,0
Taux de réponse			94,7
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		96	4,0
Usage nocif		145	6,0
Dépendance		2 161	90,0
Total réponses "utiles" Usage BHD		2 402	100,0
Taux de réponse			87,3
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		35	1,9
1 à 5 ans		381	20,7
5 à 10 ans		497	27,0
10 ans et plus		928	50,4
Total réponses "utiles" Début BHD		1 841	100,0
Taux de réponse			66,9

**Tableau 31 - Répartition des personnes pour lesquelles la cocaïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>3 132</b>	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		457	15,7
Fumé/inhalé		523	17,9
Mangé/bu		36	1,2
Sniffé		1 882	64,5
Autres		19	0,7
Total réponses "utiles" Mode conso Cocaïne		2 917	100,0
Taux de réponse			93,1
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		596	20,4
1 fois/sem ou moins		505	17,3
2 à 3 fois/semaine		558	19,1
4 à 6 fois/semaine		232	7,9
Chaque jour		1 035	35,4
Total réponses "utiles" Fréquence Cocaïne		2 926	100,0
Taux de réponse			93,4
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		374	14,3
Usage nocif		671	25,6
Dépendance		1 574	60,1
Total réponses "utiles" Usage Cocaïne		2 619	100,0
Taux de réponse			83,6
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		30	1,3
1 à 5 ans		473	20,3
5 à 10 ans		545	23,3
10 ans et plus		1 287	55,1
Total réponses "utiles" Début Cocaïne		2 335	100,0
Taux de réponse			74,6

**Tableau 32 - Répartition des personnes pour lesquelles le crack est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>			<b>885</b>			
<i>Mode de consommation</i>						
Injecté			11	1,3		
Fumé/inhalé			786	93,7		
Mangé/bu			12	1,4		
Sniffé			27	3,2		
Autres			3	0,4		
Total réponses "utiles" Mode conso Crack			839	100,0		
Taux de réponse				94,8		
<i>Fréquence de consommation</i>						
1 fois dans le mois			81	9,5		
1 fois/sem ou moins			113	13,3		
2 à 3 fois/semaine			207	24,3		
4 à 6 fois/semaine			47	5,5		
Chaque jour			403	47,4		
Total réponses "utiles" Fréquence Crack			851	100,0		
Taux de réponse				96,2		
<i>Usage</i>						
Usage à risque			66	8,4		
Usage nocif			127	16,2		
Dépendance			589	75,3		
Total réponses "utiles" Usage Crack			782	100,0		
Taux de réponse				88,4		
<i>Début de la consommation</i>						
Moins d'un an			8	1,2		
1 à 5 ans			125	18,3		
5 à 10 ans			141	20,6		
10 ans et plus			409	59,9		
Total réponses "utiles" Début Crack			683	100,0		
Taux de réponse				77,2		

**Tableau 33 - Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Jamais	-	-	13 873	60,5	-	-
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée	-	-	3 488	15,2	-	-
Oui dans l'année mais pas dans le mois	-	-	2 274	9,9	-	-
Oui au cours des 30 derniers jours	-	-	3 309	14,4	-	-
Total réponses "utiles" Injection	-	-	22 944	100,0	-	-
Taux de réponse				52,5		

**Tableau 34 - Age moyen lors de la première injection**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
<b>Effectif</b>			<b>8 902</b>			
moyenne	0,0		21,6		0,0	
écart-type	0,0		5,6		0,0	
médiane			20,0			

**Tableau 35 - Répartition suivant le partage des seringues**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Jamais	-	-	7 471	77,7	-	-
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée	-	-	1 097	11,4	-	-
Oui dans l'année mais pas dans le mois	-	-	762	7,9	-	-
Oui au cours des 30 derniers jours	-	-	288	3,0	-	-
Total réponses "utiles" Partage seringue	-	-	9 618	100,0	-	-
Taux de réponse (en référence au nombre total des sujets s'i				53,0		

## 5. Traitements de substitution et autres traitements

**Tableau 36 - Répartition suivant le traitement de substitution aux opiacés en cours**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Non	-	-	9 376	24,1	-	-
Oui, Méthadone	-	-	16 891	43,4	-	-
Oui, Subutex	-	-	11 660	30,0	-	-
Oui, autre	-	-	986	2,5	-	-
Total réponses "utiles" Substitution	-	-	38 913	100,0	-	-
Taux de réponse				89,0		

**Tableau 37 - Répartition suivant la durée des traitements de substitution aux opiacés en cours**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Depuis moins de 6 mois	-	-	2 170	13,4	-	-
De 6 mois à 1 an	-	-	1 206	7,5	-	-
De 1 an à 2 ans	-	-	1 908	11,8	-	-
De 2 à 5 ans	-	-	4 126	25,5	-	-
Depuis plus de 5 ans	-	-	6 762	41,8	-	-
Total réponses "utiles" Durée Substitution	-	-	16 172	100,0	-	-
Taux de réponse (en référence au nombre total des patients)	0	-	-	54,8	0	-

**Tableau 38 - Répartition des personnes ayant suivi au moins un autre traitement médicamenteux**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Acamprosate	13	0,9	131	1,4	1 373	13,1
Naltrexone	9	0,6	82	0,9	619	5,9
Antabuse	7	0,5	61	0,7	129	1,2
Substitut nicotiques	14	0,9	106	1,2	230	2,2
Bupropion	21	1,4	118	1,3	101	1,0
Anxiolytiques	882	59,3	6 141	67,3	7 130	68,0
Hypnotiques	337	22,6	2 793	30,6	2 477	23,6
Antidépresseurs	623	41,9	3 546	38,9	5 420	51,7
Neuroleptiques	531	35,7	2 823	30,9	1 771	16,9
Au moins un traitement cité	1 488	5,1	9 125	20,9	10 481	14,3

## 6. Sérologies VIH et VHC

**Tableau 39 - Répartition suivant la sérologie VIH**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH positive	-	-	953	4,4	-	-
Sérologie VIH négative	-	-	20 596	95,6	-	-
Total réponses "utiles" VIH	-	-	21 549	100,0	-	-
Taux de réponse	-	-	-	49,3	-	-

**Tableau 40 - Répartition suivant la sérologie VHC**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VHC positive	-	-	5 773	26,8	-	-
Sérologie VHC négative	-	-	15 738	73,2	-	-
Total réponses "utiles" VHC	-	-	21 511	100,0	-	-
Taux de réponse	-	-	-	49,2	-	-

**Tableau 41 - Répartition suivant la vaccination VHB complète**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Vaccination VHB complète	-	-	13 182	59,4	-	-
Vaccination VHB incomplète	-	-	8 996	40,6	-	-
Total réponses "utiles" VHB	-	-	22 178	100,0	-	-
Taux de réponse	-	-	-	50,7	-	-

## 7. Hospitalisation et tentative de suicide

**Tableau 42 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'hospitalisation pour raison psychiatrique**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Oui	5 429	35,8	12 374	39,5	10 494	26,6
Non, jamais	9 734	64,2	18 926	60,5	28 971	73,4
Total réponses "utiles" Hospitalisation antérieure	15 163	100,0	31 300	100,0	39 465	100,0
Taux de réponse	-	-	-	71,6	-	53,9

**Tableau 43 - Répartition suivant le nb d'hospitalisation pour raison psychiatrique (parmi les réponses Oui à la question précédente)**

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Une hospitalisation	655	12,9	2 461	24,4	2 299	25,2
2 ou 3 hospitalisations	4 053	80,0	6 218	61,7	5 866	64,3
4 hospitalisations et plus	357	7,0	1 396	13,9	959	10,5
Total réponses "utiles" Nb hospitalisations	5 065	100,0	10 075	100,0	9 124	100,0
Taux de réponse	-	-	-	81,4	-	86,9

Tableau 44 - Répartition suivant l'existence d'antécédents de tentatives de suicide

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Oui	4 978	36,4	10 124	38,0	8 287	37,2
Non, jamais	8 693	63,6	16 497	62,0	13 992	62,8
Total réponses "utiles" TS antérieure	13 671	100,0	26 621	100,0	22 279	100,0
Taux de réponse		46,6		60,9		30,4

Tableau 45 - Répartition suivant le nb de TS (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Une TS	1 123	23,5	3 093	34,9	2 080	27,3
Deux ou trois	3 420	71,6	4 897	55,3	4 928	64,8
Plus de 4 tentatives	232	4,9	868	9,8	600	7,9
Total réponses "utiles" Nb de TS	4 775	100,0	8 858	100,0	7 608	100,0
Taux de réponse		95,9		87,5		91,8

## 8. Incarcération

Tableau 46 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'incarcération

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Oui	7 753	40,0	16 545	51,5	10 829	37,7
Non, jamais	11 651	60,0	15 602	48,5	17 880	62,3
Total réponses "utiles" Existence d'incarcération	19 404	100,0	32 147	100,0	28 709	100,0
Taux de réponse		66,2		73,5		39,2

Tableau 47 - Répartition suivant le nb d'incarcérations (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Une incarcération	1 600	41,6	3 620	35,8	2 243	42,4
2 ou 3 incarcérations	1 040	27,1	2 714	26,8	1 308	24,8
4 incarcérations et plus	1 203	31,3	3 784	37,4	1 733	32,8
Total réponses "utiles" Nb incarcérations	3 843	100,0	10 118	100,0	5 284	100,0
Taux de réponse		49,6		61,2		48,8