



Pôle « indicateurs »

RECAP

(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)

Tableaux statistiques

Présentation de RECAP

Objectif du recueil

RECAP est un recueil de données continu conçu pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation de l'offre de soins. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

Modalités du recueil

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT. Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

Critères d'inclusion

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. Ces personnes doivent pouvoir être considérées comme engagées ou cherchant à s'engager dans un processus d'accompagnement et de soins. Elles sont physiquement présentes sur le lieu de consultation. Les personnes appartenant à l'entourage d'un consommateur ou celles venues uniquement pour obtenir de l'information ou encore celles qui ne font que passer pour chercher du matériel de réduction des risques ne doivent pas être incluses. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont en revanche incluses dans le recueil.

Couverture du recueil

En 2015, environ 189 000 patients vus dans 269 CSAPA ambulatoires distincts, 8 CSAPA avec hébergement et 4 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête.

Informations recueillies

1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques des personnes prises en charge
2. Prise en charge
3. Produits consommés
4. Mode, fréquence, type et durée de consommation des produits
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

Répartition en groupes

Parmi les personnes accueillies dans les CSAPA trois populations se distinguent, avec un premier groupe qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 37 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne. Un deuxième groupe est constitué de personnes dont l'âge moyen est 26 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis alors que le troisième groupe comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 43 ans et qui ont un problème avec l'alcool. A partir des données RECAP de l'année 2014, les personnes accueillies en raison d'un problème d'addiction sans substances ne sont plus incluses dans le groupe opiacés, cocaïne et autres produits. La croissance des effectifs de cette catégorie de personnes qui présentent des profils spécifiques tendait à modifier artificiellement certaines caractéristiques des usagers d'opiacés ou de cocaïne. Les données moyennes calculées sur l'ensemble des trois catégories principales d'usagers (d'opiacés et de cocaïne, de cannabis et d'alcool) ont une signification limitée. Les caractéristiques qui se dégagent et leurs évolutions dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il est plus pertinent de décrire les caractéristiques spécifiques de chacune de ces trois populations.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « groupe cannabis », le deuxième par « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** », et le troisième par « **groupe alcool** ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le critère d'inclusion dans le « groupe alcool, tabac » est que l'alcool ou le tabac soient cités comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que l'alcool ou le tabac comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie des deux groupes précédents et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Il peut être noté que les personnes de ce groupe peuvent être consommatrices de cannabis soit parce que cette substance est mentionnée en produit autre que le produit n°1, soit pour des personnes ayant un produit autre que le cannabis à l'origine de la prise en charge et/ou suivant un traitement de substitution aux opiacés.

L'information sur les produits ou sur les addictions est absente pour environ 10 % des personnes vus dans les CSAPA.

Pour le détail des questions RECAP, pour consulter le guide du questionnaire RECAP, le protocole européen d'enregistrement des demandes de traitement, voir les documents en ligne consultable à l'adresse : <http://www.ofdt.fr/enquetes/recap/presentation/>

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2015/OFDT

1. Nombre et caractéristiques socio – démographiques des personnes prises en charge

Tableau 1 - Nombre de personnes incluses dans RECAP en 2015

	N	%
1. Groupe cannabis	34 214	20,0
2. Groupe opiacés, cocaïne, autres produits	47 259	27,6
3. Groupe alcool	85 015	49,7
4. Groupe addictions sans substances	4 466	2,6
Total avec produits ou addictions connues	170 954	100,0
Sans informations sur les produits ou addictions	18 330	9,7
Total général	189 284	100,0

Tableau 2 - Répartition par sexe

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Homme	28 986	84,8	36 611	77,5	64 694	76,2
Femme	5 179	15,2	10 611	22,5	20 225	23,8
Total réponses "utiles" Sexe	34 165	100,0	47 222	100,0	84 919	100,0
Taux de réponse		99,9		99,9		99,9

Tableau 3 - Age (moyenne et médiane)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
moyenne	33 951	26,4	47 071	37,5	84 484	43,8
écart-type	9,4	9,4	9,8	9,8	13,0	13,0
médiane	24,0	24,0	37,0	37,0	44,0	44,0

Tableau 4 - Répartition par âge

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Moins de 20 ans	9 270	27,3	772	1,6	2 220	2,6
Dont moins de 18 ans	4 721	13,9	299	0,6	1 127	1,3
De 20 à 24 ans	8 503	25,0	2 787	5,9	3 898	4,6
De 25 à 29 ans	6 050	17,8	6 831	14,5	6 537	7,7
De 30 à 39 ans	6 584	19,4	17 634	37,5	19 092	22,6
De 40 à 49 ans	2 598	7,7	13 476	28,6	24 041	28,5
De 50 à 59 ans	821	2,4	4 780	10,2	18 580	22,0
Plus de 60 ans	125	0,4	791	1,7	10 116	12,0
Total réponses "utiles" Age	33 951	100,0	47 071	100,0	84 484	100,0
Taux de réponse		99,2		99,6		99,4

Tableau 5 - Répartition suivant le nombre d'enfants

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Sans enfant	25 677	78,5	24 815	55,4	32 744	39,6
1 enfant	3 381	10,3	9 586	21,4	15 919	19,2
2 enfants ou plus	3 660	11,2	10 355	23,1	34 112	41,2
Total réponses "utiles" Nb enfants	32 718	100,0	44 756	100,0	82 775	100,0
Taux de réponse		95,6		94,7		97,4

Tableau 6 - Répartition suivant la CSP

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Agriculteur	109	0,4	189	0,5	744	1,0
Artisan commerçant	714	2,5	1 446	3,5	3 433	4,7
Cadre Prof Libérale	424	1,5	919	2,2	3 737	5,1
Profession intermédiaire	481	1,7	1 065	2,6	2 985	4,1
Employé	6 688	23,7	11 740	28,4	24 881	34,0
Ouvrier	5 855	20,8	11 418	27,7	18 445	25,2
Retraité	70	0,2	301	0,7	4 842	6,6
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	13 824	49,1	14 210	34,4	14 009	19,2
Total réponses "utiles" CSP	28 165	100,0	41 288	100,0	73 076	100,0
Taux de réponse		82,3		87,4		86,0

Tableau 7 - Répartition suivant l'entourage

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Vit seul	6 374	20,0	16 066	34,9	30 268	36,8
Vit avec ses parents	14 388	45,2	8 173	17,8	10 217	12,4
Vit seul(e) avec enfant(s)	770	2,4	2 224	4,8	4 726	5,7
Vit avec un conjoint seulement	2 820	8,9	6 116	13,3	14 027	17,0
Vit avec conjoint et enfant(s)	3 293	10,3	6 668	14,5	15 676	19,0
Vit avec des amis	703	2,2	1 579	3,4	1 625	2,0
Vit en établissement pénitentiaire	392	1,2	634	1,4	785	1,0
Autre	3 079	9,7	4 538	9,9	5 008	6,1
Total réponses "utiles" Entourage	31 819	100,0	45 998	100,0	82 332	100,0
Taux de réponse		93,0		97,3		96,8

Tableau 8 - Répartition suivant le logement

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Durable indépendant	12 862	40,7	24 654	55,0	60 147	74,0
Durable chez des proches	13 915	44,1	8 386	18,7	9 573	11,8
Durable en institution	582	1,8	735	1,6	1 352	1,7
Provisoire chez des proches	1 421	4,5	3 037	6,8	3 292	4,1
Provisoire en institution	1 274	4,0	2 420	5,4	2 952	3,6
Autre Provisoire	824	2,6	1 871	4,2	1 813	2,2
Etablissement pénitentiaire	349	1,1	1 491	3,3	665	0,8
SDF	354	1,1	2 255	5,0	1 464	1,8
Total réponses "utiles" Logement	31 581	100,0	44 849	100,0	81 258	100,0
Taux de réponse		92,3		94,9		95,6

Tableau 9 - Répartition suivant l'origine des ressources

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Revenus d'emplois	5 202	36,4	6 131	34,6	30 708	52,3
Retraites ou pensions d'invalidité	36	0,3	303	1,7	2 280	3,9
ASSEDIC	1 487	10,4	2 189	12,4	7 123	12,1
RSA	1 351	9,4	4 168	23,5	8 515	14,5
AAH	433	3,0	1 824	10,3	3 448	5,9
Autres prestations sociales	200	1,4	442	2,5	1 128	1,9
Ressources provenant d'un tiers	1 867	13,1	439	2,5	1 095	1,9
Autres ressources (y compris sans revenus)	3 730	26,1	2 217	12,5	4 399	7,5
Total réponses "utiles" Origine des ressources	14 306	100,0	17 713	100,0	58 696	100,0
Taux de réponse		41,8		37,5		69,0

Tableau 10 - Répartition suivant la situation professionnelle

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Activité rémunérée continue	6 653	21,0	10 637	24,2	29 811	37,7
CDD de plus de 6 mois	699	2,2	1 297	3,0	1 013	1,3
Activité rémunérée intermittente	3 413	10,8	5 361	12,2	5 564	7,0
Chômage	6 170	19,5	10 982	25,0	17 234	21,8
Etudiant, élève, stage non rémunéré	8 458	26,7	1 376	3,1	2 822	3,6
Retraité	40	0,1	287	0,7	6 329	8,0
Autre inactif	6 233	19,7	13 984	31,8	16 268	20,6
Total réponses "utiles" Situation Professionnelle	31 666	100,0	43 924	100,0	79 041	100,0
Taux de réponse		92,6		92,9		93,0

Tableau 11 - Répartition suivant le niveau d'étude

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Pas terminé le primaire	177	0,7	338	0,9	629	1,0
Niveau primaire	890	3,3	1 750	4,8	2 900	4,7
Niveau BEPC	5 710	21,3	6 186	17,0	9 024	14,6
Niveau BEP, CAP	10 462	39,1	16 994	46,6	26 768	43,4
Niveau Bac	6 648	24,8	6 498	17,8	10 034	16,3
Niveau Bac+2	1 795	6,7	2 749	7,5	6 426	10,4
Niveau au-delà Bac+2	1 099	4,1	1 929	5,3	5 931	9,6
Total réponses "utiles" Niveau scolaire	26 781	100,0	36 444	100,0	61 712	100,0
Taux de réponse		78,3		77,1		72,6

2. Origine et ancienneté de la prise en charge

Tableau 12 - Répartition suivant l'origine de la PEC

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Le patient lui-même	7 230	25,7	23 599	54,1	28 823	40,9
Les proches (familles/amis)	3 528	12,5	3 013	6,9	4 932	7,0
Médecin de ville	914	3,2	3 893	8,9	7 780	11,0
CSAPA, assimilé	205	0,7	3 029	6,9	746	1,1
Structures de RDR	47	0,2	501	1,1	304	0,4
Structure spécialisée en alcoologie	123	0,4	397	0,9	2 703	3,8
Equipe de liaison	202	0,7	876	2,0	2 850	4,0
Autre hôpital/autre sanitaire	1 356	4,8	2 760	6,3	7 348	10,4
Institutions et services soc	1 461	5,2	1 176	2,7	3 653	5,2
Obligation de soins	5 431	19,3	2 325	5,3	6 647	9,4
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencielle	1 156	4,1	598	1,4	1 051	1,5
Classement avec orientation	3 311	11,8	373	0,9	1 428	2,0
Autre mesure judiciaire ou administrative	1 571	5,6	285	0,7	255	0,4
Milieu scolaire/universitaire	977	3,5	131	0,3	547	0,8
Autre	632	2,2	670	1,5	1 411	2,0
Total réponses "utiles" Origine de la PEC	28 144	100,0	43 626	100,0	70 478	100,0
Taux de réponse		82,3		92,3		82,9

Tableau 13 - Répartition suivant l'existence de PEC antérieures

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Jamais été pris en charge	15 855	80,4	11 146	33,6	18 827	53,4
Suivi actuellement	2 598	13,2	10 425	31,4	9 954	28,3
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	1 267	6,4	11 630	35,0	6 445	18,3
Total réponses "utiles" PEC antérieure	19 720	100,0	33 201	100,0	35 226	100,0
Taux de réponse		57,6		70,3		41,4

Tableau 14 - Répartition suivant l'année de la première PEC

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Cette année	514	23,3	1 109	9,0	1 730	16,9
Un à deux ans auparavant	534	24,2	2 022	16,3	2 390	23,3
Trois à cinq ans auparavant	507	23,0	3 053	24,6	2 429	23,7
plus de 5 ans auparavant	654	29,6	6 206	50,1	3 691	36,0
Total réponses "utiles" Année de la première PEC	2 209	100,0	12 390	100,0	10 240	100,0
Taux de réponse		6,5		26,2		12,0

3. Produits utilisés, modes et fréquences de consommation des personnes prises en charge

Tableau 15 - Répartition suivant le nombre de produits consommés dans le mois passé

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Un seul produit	15 807	49,8	13 325	31,7	39 572	49,9
2 produits	9 933	31,3	12 333	29,3	29 560	37,3
3 produits	4 985	15,7	9 787	23,3	8 293	10,5
4 produits et plus	1 023	3,2	6 577	15,7	1 855	2,3
Total réponses "utiles" nombre de produits	31 748	100,0	42 022	100,0	79 280	100,0
Taux de réponse		92,8		88,9		93,3

Tableau 16 - Répartition suivant les produits consommés, quel que soit le rang de citation du produit

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool	7 991	24,8	13 082	30,1	71 377	88,9
Tabac	17 536	54,3	26 813	61,6	49 718	61,9
Cannabis	31 944	99,0	18 603	42,8	14 777	18,4
Benzodiazépines	165	0,5	3 107	7,1	824	1,0
GHB/GBL	54	0,2	119	0,3	33	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants	154	0,5	706	1,6	144	0,2
Antidépresseurs	22	0,1	276	0,6	98	0,1
Barbituriques	14	0,0	179	0,4	22	0,0
Héroïne	566	1,8	21 072	48,4	1 315	1,6
Autres opiacés	62	0,2	2 973	6,8	190	0,2
Buprénorphine haut dosage	75	0,2	4 369	10,0	235	0,3
Méthadone	36	0,1	3 285	7,6	86	0,1
Fentanyl	15	0,0	177	0,4	44	0,1
Cocaïne	1 485	4,6	10 165	23,4	2 327	2,9
Crack	89	0,3	1 621	3,7	157	0,2
Autres dérivés cocaïne	15	0,0	38	0,1	15	0,0
MDMA et dérivés	522	1,6	1 142	2,6	261	0,3
Amphétamines	276	0,9	1 045	2,4	188	0,2
Méthamphétamines	99	0,3	179	0,4	106	0,1
Cathinones synthétiques	1	0,0	61	0,1	8	0,0
Autres stimulants	48	0,1	332	0,8	120	0,1
LSD	308	1,0	1 123	2,6	185	0,2
Champignons	85	0,3	105	0,2	48	0,1
Ketamine	42	0,1	177	0,4	53	0,1
Autres hallucinogènes	42	0,1	177	0,4	53	0,1
Colles et solvants	31	0,1	229	0,5	223	0,3
Autres produits	211	0,7	1 007	2,3	374	0,5
Jeux d'argent	145	0,4	149	0,3	359	0,4
Cyberaddiction	136	0,4	38	0,1	77	0,1
Trouble léger du comportement alimentaire	48	0,1	78	0,2	330	0,4
Autre addiction sans produit	73	0,2	79	0,2	185	0,2
Pas de produit consommé	1 932	5,6	2 187	4,6	4 462	5,2
Total réponses "utiles" Produits	32 282	198,6	43 496	263,3	80 316	184,5
Taux de réponse		94,4		92,0		94,5

Tableau 17 - Répartition suivant le produit à l'origine de la prise en charge (ou produit 1 si pas de produit à l'origine de la PEC)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool	-	-	3 105	6,9	74 546	87,7
Tabac	-	-	680	1,5	7 492	8,8
Cannabis	34 214	100,0	1 470	3,3	1 984	2,3
Benzodiazépines	-	-	1 014	2,3	30	0,0
GHB_GBL	-	-	37	0,1	1	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants	-	-	344	0,8	11	0,0
Antidépresseurs	-	-	126	0,3	7	0,0
Barbituriques	-	-	82	0,2	5	0,0
Héroïne	-	-	24 186	53,7	371	0,4
Autres opiacés	-	-	2 432	5,4	63	0,1
Buprénorphine haut dosage	-	-	3 351	7,4	61	0,1
Méthadone	-	-	1 861	4,1	26	0,0
Fentanyl	-	-	143	0,3	8	0,0
Cocaïne	-	-	3 322	7,4	162	0,2
Crack	-	-	774	1,7	28	0,0
Dérivés de la cocaïne	-	-	27	0,1	2	0,0
MDMA et dérivés	-	-	229	0,5	11	0,0
Cathinones synthétiques	-	-	38	0,1	1	0,0
Amphétamines	-	-	282	0,6	18	0,0
Méthamphétamines	-	-	24	0,1	-	-
Autres stimulants	-	-	86	0,2	19	0,0
LSD	-	-	478	1,1	29	0,0
Champignons	-	-	13	0,0	5	0,0
Ketamine	-	-	37	0,1	3	0,0
Autres hallucinogènes	-	-	27	0,1	2	0,0
Colles et solvants	-	-	88	0,2	2	0,0
Autres produits	-	-	803	1,8	28	0,0
Jeux d'argent	-	-	1	0,0	48	0,1
Cyberaddiction	-	-	-	-	2	0,0
Trouble léger du comportement alimentaire	-	-	1	0,0	27	0,0
Autre addiction sans produit	-	-	1	0,0	23	0,0
Total réponses "utiles" Produits	34 214	100,0	45 062	100,0	85 015	100,0
Taux de réponse		100,0		95,4		100,0

Tableau 18 - Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (produit 1)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool 1	-	-	4 070	9,7	67 979	85,7
Tabac 1	-	-	1 683	4,0	10 166	12,8
Cannabis 1	31 748	100,0	3 790	9,0	1 135	1,4
Benzodiazépines 1	-	-	1 196	2,8	-	-
GHB_GBL1	-	-	38	0,1	-	-
Autres hypnot. et tranquillisants 1	-	-	356	0,8	-	-
Antidépresseurs 1	-	-	127	0,3	-	-
Barbituriques 1	-	-	70	0,2	-	-
Héroïne 1	-	-	17 448	41,5	-	-
Autres opiacés 1	-	-	2 128	5,1	-	-
Buprénorphine haut dosage 1	-	-	2 732	6,5	-	-
Méthadone 1	-	-	1 705	4,1	-	-
Fentanyl1	-	-	96	0,2	-	-
Cocaïne 1	-	-	3 553	8,5	-	-
Crack 1	-	-	812	1,9	-	-
Derives de la cocaïne 1	-	-	23	0,1	-	-
MDMA et dérivés 1	-	-	253	0,6	-	-
Cathinones synthétiques 1	-	-	41	0,1	-	-
Amphétamines 1	-	-	325	0,8	-	-
Methamphetamines 1	-	-	26	0,1	-	-
Autres stimulants 1	-	-	103	0,2	-	-
LSD 1	-	-	492	1,2	-	-
Champignons 1	-	-	22	0,1	-	-
Ketamine 1	-	-	53	0,1	-	-
Autres hallucinogènes 1	-	-	35	0,1	-	-
Colles et solvants 1	-	-	106	0,3	-	-
Autres produits 1	-	-	738	1,8	-	-
Jeux d'argent 1	-	-	-	-	-	-
Cyberaddictions 1	-	-	-	-	-	-
Trouble léger du comportement alimentaire 1	-	-	-	-	-	-
Autre addiction sans produit 1	-	-	-	-	-	-
Total réponses "utiles" Produit 1	31 748	100,0	42 021	100,0	79 280	100,0
Taux de réponse		92,8		88,9		93,3
Pas de produit consommé 1	1 011	3,0	2 631	5,6	3 031	3,6

Tableau 19 - Répartition suivant le deuxième produit consommé

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool 2	5 115	31,8	4 752	16,5	2 739	6,8
Tabac 2	8 846	54,9	4 951	17,2	25 593	63,8
Cannabis 2	-	-	7 280	25,3	8 226	20,5
Benzodiazépines 2	78	0,5	900	3,1	468	1,2
GHB_GBL2	32	0,2	27	0,1	2	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants 2	126	0,8	212	0,7	71	0,2
Antidépresseurs 2	11	0,1	91	0,3	70	0,2
Barbituriques 2	7	0,0	42	0,1	10	0,0
Héroïne 2	245	1,5	2 263	7,9	467	1,2
Autres opiacés 2	29	0,2	543	1,9	120	0,3
Buprénorphine haut dosage 2	34	0,2	998	3,5	102	0,3
Méthadone 2	9	0,1	1 003	3,5	44	0,1
Fentanyl 2	4	0,0	31	0,1	15	0,0
Cocaïne 2	694	4,3	3 942	13,7	860	2,1
Crack 2	43	0,3	444	1,5	77	0,2
Derives de la cocaïne 2	6	0,0	8	0,0	11	0,0
MDMA et dérivés 2	221	1,4	273	0,9	55	0,1
Amphétamines 2	96	0,6	263	0,9	46	0,1
Methamphetamines 2	10	0,1	23	0,1	3	0,0
Cathinones synthétiques 2	1	0,0	7	0,0	1	0,0
Autres stimulants 2	20	0,1	121	0,4	94	0,2
LSD 2	101	0,6	175	0,6	24	0,1
Champignon 2	25	0,2	16	0,1	8	0,0
Ketamine 2	11	0,1	58	0,2	19	0,0
Autres hallucinogènes 2	10	0,1	43	0,1	20	0,0
Colles et solvants 2	16	0,1	57	0,2	204	0,5
Autres produits 2	102	0,6	129	0,4	204	0,5
Jeux d'argent 2	75	0,5	66	0,2	184	0,5
Cyberaddiction 2	67	0,4	17	0,1	37	0,1
Trouble léger du comportement alimentaire 2	26	0,2	32	0,1	235	0,6
Autre addiction sans produit 2	46	0,3	33	0,1	101	0,3
Total réponses "utiles" Produit 2	16 106	100,0	28 800	100,0	40 110	100,0
Taux de réponse		47,1		60,9		47,2
Pas de produit consommé 2	2 455	7,2	3 298	7,0	10 652	12,5

Tableau 20 - Répartition suivant le troisième produit consommé

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Alcool 3	2 691	43,7	2 742	16,6	625	5,9
Tabac 3	1 833	29,8	3 799	23,1	3 001	28,4
Cannabis 3	-	-	3 993	24,2	4 339	41,1
Benzodiazepines 3	52	0,8	623	3,8	259	2,5
GHB_GBL 3	17	0,3	37	0,2	20	0,2
Autres hypnot. et tranquillisants 3	13	0,2	81	0,5	49	0,5
Antidépresseurs 3	8	0,1	38	0,2	19	0,2
Barbituriques 3	7	0,1	41	0,2	7	0,1
Héroïne 3	209	3,4	902	5,5	467	4,4
Autres opiacés 3	20	0,3	197	1,2	52	0,5
Buprénorphine haut dosage 3	20	0,3	402	2,4	68	0,6
Méthadone 3	12	0,2	350	2,1	25	0,2
Fentanyl 3	6	0,1	34	0,2	19	0,2
Cocaïne 3	525	8,5	1 741	10,6	830	7,9
Crack 3	30	0,5	231	1,4	53	0,5
Derives de la cocaïne 3	5	0,1	5	0,0	3	0,0
MDMA et dérivés 3	176	2,9	315	1,9	99	0,9
Amphétamines 3	109	1,8	255	1,5	63	0,6
Methamphétamines 3	54	0,9	60	0,4	23	0,2
Cathinones synthétiques 3	-	-	6	0,0	5	0,0
Autres stimulants 3	14	0,2	63	0,4	17	0,2
LSD 3	102	1,7	207	1,3	51	0,5
Champignon 3	23	0,4	21	0,1	9	0,1
Ketamine 3	8	0,1	49	0,3	3	0,0
Autres hallucinogènes 3	15	0,2	49	0,3	19	0,2
Colles et solvants 3	15	0,2	47	0,3	12	0,1
Autres produits 3	65	1,1	74	0,4	107	1,0
Jeux d'argent 3	48	0,8	52	0,3	142	1,3
Cyberaddiction 3	49	0,8	7	0,0	31	0,3
Trouble léger du comportement alimentaire 3	12	0,2	26	0,2	80	0,8
Autre addiction sans produit 3	17	0,3	27	0,2	58	0,5
Total réponses "utiles" Produit 3	6 155	100,0	16 474	100,0	10 557	100,0
Taux de réponse		18,0		34,9		12,4
Pas de produit consommé 3	1 498	4,4	2 309	4,9	4 228	5,0

Tableau 21 - Nb moyen de cigarettes/j pour les fumeurs quotidiens

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	13 353		24 293		33 166	
moyenne	12,1		16,7		18,0	
écart-type	7,8		9,0		10,4	
médiane	10,0		15,0		20,0	

Tableau 22 - Répartition des fumeurs quotidiens suivant le nombre de cigarette/j

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
1 à 9 cigarettes	4 435	33,2	3 108	12,8	4 666	14,1
10 à 19 cigarettes	5 588	41,8	9 595	39,5	11 422	34,4
20 à 39 cigarettes	3 136	23,5	10 578	43,5	14 955	45,1
plus de 40 cigarettes	194	1,5	1 012	4,2	2 123	6,4
Total réponses "utiles" Nb de cigarettes	13 353	100,0	24 293	100,0	33 166	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		76,1		90,6		66,7

Tableau 23 - Nb moyen de joints/j pour les fumeurs quotidiens de cannabis

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	10 651		8 454		3 415	
moyenne	5,9		4,7		5,0	
écart-type	5,7		7,4		6,4	
médiane	4,0		3,0		3,0	

Tableau 24 - Répartition des fumeurs de cannabis quotidiens suivant le nombre de joints/j

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
1 à 3 joints	4 492	42,2	5 023	59,4	1 857	54,4
4 à 6 joints	3 044	28,6	1 938	22,9	835	24,5
7 joints et plus	3 115	29,2	1 493	17,7	723	21,2
Total réponses "utiles" Nb de joints	10 651	100,0	8 454	100,0	3 415	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		33,3		45,4		23,1

4. Modes, fréquences, types, délai de consommation suivant le produit posant le plus de problèmes

Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse			4 070		67 979	
<i>Fréquence de consommation</i>						
Pas plus d'une fois au cours des 30 derniers jours			272	7,0	8 578	13,8
1 fois/sem ou moins			253	6,5	6 971	11,2
2 à 3 fois/semaine			361	9,3	5 114	8,2
4 à 6 fois/semaine			318	8,2	10 775	17,3
Chaque jour			2 660	68,8	30 934	49,6
Total réponses "utiles" Fréquence Alcool			3 864	100,0	62 372	100,0
Taux de réponse				94,9		91,8
<i>Usage/dépendance</i>						
Usage à risque			324	9,0	4 991	9,0
Usage nocif			693	19,3	16 055	28,9
Dépendance			2 581	71,7	34 453	62,1
Total réponses "utiles" Usage Alcool			3 598	100,0	55 499	100,0
Taux de réponse				88,4		81,6
<i>Début d'alcoolisation</i>						
Moins de 5 ans			113	4,2	1 733	4,7
5-14 ans			590	22,1	7 969	21,4
15-19 ans			493	18,5	5 183	13,9
20-24 ans			490	18,4	5 162	13,9
25 ans et plus			984	36,9	17 184	46,2
Total réponses "utiles" Début Alcool 1			2 670	100,0	37 231	100,0
Taux de réponse				65,6		54,8

Tableau 26 - Répartition des personnes pour lesquelles le cannabis est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse	31 748		3 790			
<i>Mode de consommation</i>						
Injecté	-	-	-	-		
Fumé/inhalé	29 866	98,1	3 605	98,7		
Mangé/bu	516	1,7	46	1,3		
Sniffé	-	-	-	-		
Autres	47	0,2	-	-		
Total réponses "utiles" Mode conso Cannabis	30 429	100,0	3 651	100,0		
Taux de réponse		95,8		96,3		
<i>Fréquence de consommation</i>						
1 fois dans le mois	2 991	10,2	357	9,9		
1 fois/sem ou moins	2 494	8,5	326	9,0		
2 à 3 fois/semaine	2 812	9,6	495	13,7		
4 à 6 fois/semaine	2 472	8,4	158	4,4		
Chaque jour	18 587	63,3	2 273	63,0		
Total réponses "utiles" Fréquence Cannabis	29 356	100,0	3 609	100,0		
Taux de réponse		92,5		95,2		
<i>Usage/dépendance</i>						
Usage à risque	4 282	16,3	596	17,7		
Usage nocif	6 563	25,0	832	24,7		
Dépendance	15 439	58,7	1 943	57,6		
Total réponses "utiles" Usage Cannabis	26 284	100,0	3 371	100,0		
Taux de réponse		82,8		88,9		
<i>Début de la consommation</i>						
Moins d'un an	296	1,2	4	0,1		
1 à 5 ans	7 075	28,9	125	4,1		
5 à 10 ans	6 634	27,1	264	8,7		
10 ans et plus	10 512	42,9	2 647	87,1		
Total réponses "utiles" Début Cannabis	24 517	100,0	3 040	100,0		
Taux de réponse		77,2		80,2		

Tableau 27 - Répartition des personnes pour lesquelles les benzodiazépines sont les produits posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		1 196	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		14	1,3
Fumé/inhalé		-	-
Mangé/bu		1 023	94,7
Sniffé		24	2,2
Autres		19	1,8
Total réponses "utiles" Mode conso Benzodiazépine		1 080	100,0
Taux de réponse			90,3
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		47	4,3
1 fois/sem ou moins		23	2,1
2 à 3 fois/semaine		57	5,2
4 à 6 fois/semaine		63	5,7
Chaque jour		915	82,8
Total réponses "utiles" Fréquence Benzodiazépine		1 105	100,0
Taux de réponse			92,4
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		64	6,1
Usage nocif		103	9,8
Dépendance		883	84,1
Total réponses "utiles" Usage Benzodiazépine		1 050	100,0
Taux de réponse			87,8
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		10	1,4
1 à 5 ans		118	16,0
5 à 10 ans		148	20,1
10 ans et plus		460	62,5
Total réponses "utiles" Début Benzodiazépine		736	100,0
Taux de réponse			61,5

Tableau 28 - Répartition des personnes pour lesquelles l'héroïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		17 448	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		3 172	19,7
Fumé/inhalé		3 001	18,6
Mangé/bu		156	1,0
Sniffé		9 697	60,2
Autres		76	0,5
Total réponses "utiles" Mode conso Héroïne		16 102	100,0
Taux de réponse			92,3
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		2 110	13,3
1 fois/sem ou moins		1 344	8,5
2 à 3 fois/semaine		1 419	9,0
4 à 6 fois/semaine		1 205	7,6
Chaque jour		9 765	61,6
Total réponses "utiles" Fréquence Héroïne		15 843	100,0
Taux de réponse			90,8
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		838	6,0
Usage nocif		925	6,6
Dépendance		12 181	87,4
Total réponses "utiles" Usage Héroïne		13 944	100,0
Taux de réponse			79,9
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		61	0,4
1 à 5 ans		1 419	10,3
5 à 10 ans		3 168	22,9
10 ans et plus		9 171	66,4
Total réponses "utiles" Début Héroïne		13 819	100,0
Taux de réponse			79,2

Tableau 29 - Répartition des personnes pour lesquelles la méthadone est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		1 705	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		28	1,8
Fumé/inhalé		12	0,8
Mangé/bu		1 428	93,8
Sniffé		22	1,4
Autres		32	2,1
Total réponses "utiles" Mode conso Méthadone		1 522	100,0
Taux de réponse			89,3
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		23	1,4
1 fois/sem ou moins		16	1,0
2 à 3 fois/semaine		57	3,6
4 à 6 fois/semaine		59	3,7
Chaque jour		1 437	90,3
Total réponses "utiles" Fréquence Méthadone		1 592	100,0
Taux de réponse			93,4
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		104	6,9
Usage nocif		49	3,2
Dépendance		1 364	89,9
Total réponses "utiles" Usage Méthadone		1 517	100,0
Taux de réponse			89,0
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		45	4,2
1 à 5 ans		388	35,9
5 à 10 ans		318	29,4
10 ans et plus		330	30,5
Total réponses "utiles" Début Méthadone		1 081	100,0
Taux de réponse			63,4

Tableau 30 - Répartition des personnes pour lesquelles la BHD est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		2 732	
<i>Mode de consommation</i>			
Injecté		715	28,5
Fumé/inhalé		112	4,5
Mangé/bu		991	39,5
Sniffé		630	25,1
Autres		59	2,4
Total réponses "utiles" Mode conso BHD		2 507	100,0
Taux de réponse			91,8
<i>Fréquence de consommation</i>			
1 fois dans le mois		61	2,4
1 fois/sem ou moins		59	2,3
2 à 3 fois/semaine		126	4,9
4 à 6 fois/semaine		127	4,9
Chaque jour		2 200	85,5
Total réponses "utiles" Fréquence BHD		2 573	100,0
Taux de réponse			94,2
<i>Usage/dépendance</i>			
Usage à risque		99	4,1
Usage nocif		129	5,4
Dépendance		2 174	90,5
Total réponses "utiles" Usage BHD		2 402	100,0
Taux de réponse			87,9
<i>Début de la consommation</i>			
Moins d'un an		29	1,6
1 à 5 ans		324	17,8
5 à 10 ans		491	26,9
10 ans et plus		980	53,7
Total réponses "utiles" Début BHD		1 824	100,0
Taux de réponse			66,8

Tableau 31 - Répartition des personnes pour lesquelles la cocaïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Effectif auquel se rapporte le taux de réponse	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Mode de consommation			3 553			
Injecté			493	14,8		
Fumé/inhalé			586	17,6		
Mangé/bu			36	1,1		
Sniffé			2 197	65,9		
Autres			22	0,7		
Total réponses "utiles" Mode conso Cocaïne			3 334	100,0		
Taux de réponse				93,8		
Fréquence de consommation						
1 fois dans le mois			669	20,2		
1 fois/sem ou moins			582	17,6		
2 à 3 fois/semaine			606	18,3		
4 à 6 fois/semaine			308	9,3		
Chaque jour			1 140	34,5		
Total réponses "utiles" Fréquence Cocaïne			3 305	100,0		
Taux de réponse				93,0		
Usage/dépendance						
Usage à risque			394	13,3		
Usage nocif			818	27,6		
Dépendance			1 751	59,1		
Total réponses "utiles" Usage Cocaïne			2 963	100,0		
Taux de réponse				83,4		
Début de la consommation						
Moins d'un an			28	1,1		
1 à 5 ans			506	19,2		
5 à 10 ans			598	22,7		
10 ans et plus			1 505	57,1		
Total réponses "utiles" Début Cocaïne			2 637	100,0		
Taux de réponse				74,2		

Tableau 32 - Répartition des personnes pour lesquelles le crack est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Effectif auquel se rapporte le taux de réponse	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Mode de consommation			812			
Injecté			11	1,4		
Fumé/inhalé			694	91,2		
Mangé/bu			14	1,8		
Sniffé			40	5,3		
Autres			2	0,3		
Total réponses "utiles" Mode conso Crack			761	100,0		
Taux de réponse				93,7		
Fréquence de consommation						
1 fois dans le mois			77	10,2		
1 fois/sem ou moins			100	13,3		
2 à 3 fois/semaine			194	25,7		
4 à 6 fois/semaine			32	4,2		
Chaque jour			351	46,6		
Total réponses "utiles" Fréquence Crack			754	100,0		
Taux de réponse				92,9		
Usage						
Usage à risque			71	10,2		
Usage nocif			141	20,3		
Dépendance			482	69,5		
Total réponses "utiles" Usage Crack			694	100,0		
Taux de réponse				85,5		
Début de la consommation						
Moins d'un an			8	1,3		
1 à 5 ans			120	20,1		
5 à 10 ans			106	17,8		
10 ans et plus			363	60,8		
Total réponses "utiles" Début Crack			597	100,0		
Taux de réponse				73,5		

Tableau 33 - Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Jamais	20 598	95,8	19 661	58,1	-	-
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée	171	0,8	5 745	17,0	-	-
Oui dans l'année mais pas dans le mois	584	2,7	3 069	9,1	-	-
Oui au cours des 30 derniers jours	138	0,6	5 377	15,9	-	-
Total réponses "utiles" Injection	21 491	100,0	33 852	100,0	-	-
Taux de réponse		62,8		71,6		-

Tableau 34 - Age moyen lors de la première injection

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
moyenne	207		8 962			
écart-type	20,3		21,8		0,0	
médiane	5,1		5,8		0,0	
	19,0		20,0			

Tableau 35 - Répartition suivant le partage des seringues

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Jamais	-	-	8 376	78,6	-	-
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée	-	-	1 279	12,0	-	-
Oui dans l'année mais pas dans le mois	-	-	729	6,8	-	-
Oui au cours des 30 derniers jours	-	-	271	2,5	-	-
Total réponses "utiles" Partage seringue	-	-	10 655	100,0	-	-
Taux de réponse (en référence au nombre total des sujets s'i	-	-	-	41,3	-	-

5. Traitements de substitution et autres traitements

Tableau 36 - Répartition suivant le traitement de substitution aux opiacés en cours

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Non	-	-	10 830	26,1	-	-
Oui, Méthadone	-	-	17 495	42,1	-	-
Oui, Subutex	-	-	11 944	28,8	-	-
Oui, autre	-	-	1 263	3,0	-	-
Total réponses "utiles" Substitution	-	-	41 532	100,0	-	-
Taux de réponse	-	-	-	87,9	-	-

Tableau 37 - Répartition suivant la durée des traitements de substitution aux opiacés en cours

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Depuis moins de 6 mois	-	-	2 185	12,6	-	-
De 6 mois à 1 an	-	-	962	5,5	-	-
De 1 an à 2 ans	-	-	1 920	11,0	-	-
De 2 à 5 ans	-	-	4 203	24,2	-	-
Depuis plus de 5 ans	-	-	8 116	46,7	-	-
Total réponses "utiles" Durée Substitution	-	-	17 386	100,0	-	-
Taux de réponse (en référence au nombre total des patients)	0	-	-	56,6	0	-

Tableau 38 - Répartition des patients ayant suivi au moins un autre traitement

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Acamprosate	23	1,3	152	1,5	1 617	12,0
Naltrexone	8	0,4	96	1,0	859	6,4
Antabuse	11	0,6	71	0,7	210	1,6
Substitut nicotiniques	30	1,7	219	2,2	396	2,9
Bupropion	18	1,0	102	1,0	144	1,1
Anxiolytiques	1 045	58,5	6 576	67,0	9 046	67,1
Hypnotiques	407	22,8	2 896	29,5	3 040	22,5
Antidépresseurs	742	41,5	3 807	38,8	6 798	50,4
Neuroleptiques	645	36,1	2 908	29,6	2 317	17,2
Au moins un traitement cité	1 786	5,2	9 808	20,8	13 487	15,9

6. Sérologies VIH et VHC

Tableau 39 - Répartition suivant la sérologie VIH

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH positive	46	1,1	965	4,4	246	2,1
Sérologie VIH négative	3 988	98,9	20 997	95,6	11 255	97,9
Total réponses "utiles" VIH	4 034	100,0	21 962	100,0	11 501	100,0
Taux de réponse	-	11,8	-	46,5	-	13,5

Tableau 40 - Répartition suivant la sérologie VHC

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VHC positive	121	3,2	5 752	26,0	721	6,4
Sérologie VHC négative	3 663	96,8	16 398	74,0	10 543	93,6
Total réponses "utiles" VHC	3 784	100,0	22 150	100,0	11 264	100,0
Taux de réponse		11,1		46,9		13,2

Tableau 41 - Répartition suivant la vaccination VHB complète

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Vaccination VHB complète	6 144	55,8	13 829	59,3	10 437	53,2
Vaccination VHB incomplète	4 870	44,2	9 494	40,7	9 199	46,8
Total réponses "utiles" VHB	11 014	100,0	23 323	100,0	19 636	100,0
Taux de réponse		32,2		49,4		23,1

7. Hospitalisation et tentative de suicide

Tableau 42 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'hospitalisation pour raison psychiatrique

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Oui	1 412	11,6	6 855	25,5	6 414	16,3
Non, jamais	10 767	88,4	20 032	74,5	32 901	83,7
Total réponses "utiles" Hospitalisation antérieure	12 179	100,0	26 887	100,0	39 315	100,0
Taux de réponse		35,6		56,9		46,2

Tableau 43 - Répartition suivant le nb d'hospitalisation pour raison psychiatrique (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Une hospitalisation	580	58,5	2 133	46,7	2 481	53,5
2 ou 3 hospitalisations	280	28,2	1 518	33,2	1 457	31,4
4 hospitalisations et plus	132	13,3	921	20,1	698	15,1
Total réponses "utiles" Nb hospitalisations	992	100,0	4 572	100,0	4 636	100,0
Taux de réponse		70,3		66,7		72,3

Tableau 44 - Répartition suivant l'existence d'antécédents de tentatives de suicide

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Oui	884	9,0	4 293	19,6	3 716	17,3
Non, jamais	8 926	91,0	17 591	80,4	17 815	82,7
Total réponses "utiles" TS antérieure	9 810	100,0	21 884	100,0	21 531	100,0
Taux de réponse		28,7		46,3		25,3

Tableau 45 - Répartition suivant le nb de TS (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Une TS	358	54,2	1 440	47,5	1 535	55,6
Deux ou trois	214	32,4	1 100	36,3	917	33,2
Plus de 4 tentatives	89	13,5	493	16,3	309	11,2
Total réponses "utiles" Nb de TS	661	100,0	3 033	100,0	2 761	100,0
Taux de réponse		74,8		70,6		74,3

8. Incarcération

Tableau 46 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'incarcération

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Oui	3 998	23,6	11 133	39,4	6 515	22,0
Non, jamais	12 951	76,4	17 154	60,6	23 140	78,0
Total réponses "utiles" Existence d'incarcération	16 949	100,0	28 287	100,0	29 655	100,0
Taux de réponse		49,5		59,9		34,9

Tableau 47 - Répartition suivant le nb d'incarcérations (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool	
	N	%	N	%	N	%
Une incarcération	1 845	54,6	3 647	41,0	2 751	51,3
2 ou 3 incarcérations	1 057	31,3	2 718	30,6	1 576	29,4
4 incarcérations et plus	477	14,1	2 527	28,4	1 038	19,3
Total réponses "utiles" Nb incarcérations	3 379	100,0	8 892	100,0	5 365	100,0
Taux de réponse		84,5		79,9		82,3