



Pôle « indicateurs »

RECAP

(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)

Tableaux statistiques

Présentation de RECAP

Objectif du recueil

RECAP est un recueil de données continu conçue pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST), des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et dès leur création des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation des services. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

Modalités du recueil

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT (cf. spécifications techniques). Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

Critères d'inclusion

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. La notion d'acte est ici très large, l'accueil pouvant être considéré comme un acte. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont également incluses dans le recueil.

Couverture du recueil

En 2009, environ 89 000 patients vus dans 168 CSAPA (ex CSST) ambulatoires distincts, 28 centres thérapeutiques résidentiels et 9 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête. Parmi les CSAPA en ambulatoire, les deux tiers ont fourni des données RECAP. Le taux de couverture n'est en revanche que d'un tiers pour les CSAPA avec hébergement et de 50% pour les CSAPA en milieu pénitentiaire. Le nombre de personnes accueillis dans l'ensemble des centres avec hébergement peut être estimé à environ 2000 personnes dans l'année. Le faible taux de couverture pour cette catégorie de centres ne change donc pas grand chose aux résultats nationaux.

Informations recueillies

1. Nombre de personnes prises en charge
2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge
3. Prise en charge
4. Produits utilisés
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

Répartition en groupes

Dans l'ensemble des personnes accueillies dans les CSAPA (ex CSST) deux populations se distinguent, avec un premier groupe, majoritaire, qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 35 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne, et un deuxième groupe constitué de personnes dont l'âge moyen est de 26 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis. Les données calculées sur l'ensemble de ces deux populations très différentes n'ont pas beaucoup de signification. Les caractéristiques moyennes qui se dégagent dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il paraît plus pertinent aujourd'hui pour les CCAPA de fournir des résultats séparés pour chacun de ces deux groupes.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « groupe opiacés/cocaïne et autres substances » et le deuxième par « groupe cannabis ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie du groupe cannabis et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Il peut être noté que les personnes de ce deuxième groupe peuvent être consommatrices de cannabis soit parce que cette substance est mentionnée en produit autre que le produit n°1, soit pour des personnes ayant un produit autre que le cannabis à l'origine de la prise en charge et/ou suivant un traitement de substitution aux opiacés.

L'information sur les produits est absente pour environ 10 % des personnes vues dans les CSAPA (ex CSST). Les caractéristiques principales de ce groupe ont été comparées à celles de chacun des deux groupes et à celles de l'ensemble des personnes vues dans les CSST. Les caractéristiques des personnes « sans produits » sont plus proches de celles de l'ensemble des personnes que de celles de l'un ou l'autre des deux groupes. Il peut donc être considéré que ces personnes « sans produits » se répartissent entre « groupe cannabis » et « groupes opiacé/cocaïne et autres produits » comme les personnes dont on connaît les produits consommés.

Pour le détail des questions RECAP voir les documents en ligne :

- Noyau commun de questions pour les structures spécialisées en addictologie

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_noy.doc

- Exemple de fiche patient

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_exemple_fiche_patient.pdf

RECAP 2009

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2009/OFDT

1. Nombre de personnes prises en charge incluses dans l'enquête

Répartition suivant les produits en cause

Groupe de patients	Effectif	Répartition en % entre les deux groupes de patients CSAPA avec mention d'un produit
CSAPA (ex CSST), groupe cannabis	21 072	26.7
CSAPA (ex CSST), groupe opiacés, cocaïne et autres	57 982	73.3
CSAPA (ex CSST), total avec mention de produits	79 054	100.0
CSAPA (ex CSST), sans mentions de produits	9 979	
CSAPA (ex CSST), ensemble	89 033	
CSAPA (ex CCAA)	70 933	

2. 2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge

Répartition suivant le sexe

Sexe	groupe "cannabis" (%) n=21070	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=57967	groupe CCAA (%) n=70918
Homme	87.9	77.6	77.0
Femme	12.1	22.4	23.0
Total	100.0	100.0	100.0
Taux de réponse	100.0	100.0	100.0

Age moyen

	groupe "cannabis" (%) n=21015	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=57901	groupe "CCAA" (%) n=69341
Age moyen	25.5	35.2	42.2

Age moyen et âge moyen de début de consommation suivant le premier produit consommé pour le groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Age	Age moyen n=57901	Age moyen de début de consommation n=41149
Alcool1	39.4	20.2
Tabac1	34.6	15.7
Cannabis1*	33.6	15.8
Benzodiazépines1	38.4	24.5
Autres hypnot. et tranquillisants1	36.8	25.9
Antidépresseurs1	40.3	29.7
Barbituriques1	34.6	21.3
Héroïne1	32.4	20.9
Autres opiacés1	37.7	26.0
Buprénorphine haut dosage1	35.9	27.0
Méthadone1	34.0	28.1
Cocaïne1	33.6	22.9
Crack1	39.2	26.8
MDMA et dérivés1	30.9	21.8
Amphétamines1	29.9	20.2
Autres stimulants1	29.2	18.0
LSD1	33.0	18.6
Champignons hallucinogènes1	32.7	21.3
Autres hallucinogènes1	31.7	16.7
Colles et solvants1	29.1	15.5
Autres produits1	34.8	22.5
Jeux ou cyberaddiction1	28.6	19.6
Trouble léger du comportement alimentaire1	31.8	20.7
Autre addiction sans produit1	33.3	26.9

*Dans le groupe Opiacés, cocaïne et autres produits, le cannabis consommé en produit n°1 correspond aux cas de personnes soit sous traitement de substitution aux opiacés, soit ayant un produit autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge.

Répartition suivant l'âge

Age	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=21015	(%) n=57901	(%) n=69341
moins de 20 ans	24.2	3.2	3.4
de 20 à 24 ans	30.7	11.9	6.0
de 25 à 29 ans	21.1	17.9	8.6
de 30 à 39 ans	17.5	34.6	23.0
de 40 à 49 ans	5.5	23.9	29.8
de 50 à 59 ans	0.9	6.7	20.8
plus de 60 ans	0.1	1.7	8.5
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	99.7	99.9	97.8

Répartition suivant et le nombre d'enfants

Nombre d'enfants	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=19286	(%) n=52992	(%) n=70884
Sans enfant	81.6	57.3	44.2
1 enfant	9.6	20.5	17.8
2 enfants ou plus	8.8	22.2	37.9
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	91.5	91.4	99.9

Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle

Catégorie socio professionnelle	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=18239	(%) n=49378	(%) n=63782
Agriculteur	0.2	0.3	1.7
Artisan commerçant	1.9	3.1	4.2
Cadre Prof Libérale	1.4	2.5	5.5
Profession intermédiaire	1.9	2.9	3.9
Employé	24.6	28.5	35.4
Ouvrier	24.7	28.6	28.3
Retraité	0.1	1.4	4.8
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	45.2	32.7	16.3
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	86.6	85.2	89.9

Répartition suivant les conditions de logement

Condition de logement	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=19263	(%) n=51339	(%) n=63067
Vit seul	21.5	36.1	36.6
Vit avec ses parents	50.3	22.0	14.7
Vit seul(e) avec enfant(s)	1.7	4.1	5.0
Vit avec un conjoint seulement	9.0	14.8	18.8
Vit avec conjoint et enfant(s)	9.3	14.8	20.9
Vit avec des amis	2.2	3.2	1.4
Autre	6.0	5.0	2.6
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	91.4	88.5	88.9

Répartition suivant le type de logement

Type de logement	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=19940	(%) n=54908	(%) n=65574
Durable indépendant	37.0	51.2	75.0
Durable Chez des proches	47.8	21.6	13.4
Durable en institution	1.4	1.3	1.0
Provisoire chez des proches	4.5	6.5	2.0
Provisoire en institution	3.6	5.7	1.4
Autre Provisoire	2.0	3.9	3.0
Etablissement pénitentiaire	1.8	3.0	3.2
SDF	1.9	6.8	1.2
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	94.6	94.7	92.4

Répartition suivant l'origine des ressources

Origine des ressources	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=18435	(%) n=50874	(%) n=64028
Revenus d'emplois (y compris retraites et pensions inv:	41.4	38.8	55.8
ASSEDIC	10.1	12.9	13.2
RMI	6.5	19.5	12.7
AAH	3.0	8.2	4.6
Autres prestations sociales	2.0	2.5	4.4
Ressources provenant d'un tiers	24.4	6.5	2.5
Autres ressources (y compris sans revenus)	12.7	11.6	6.8
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	87.5	87.7	90.3

Répartition suivant la situation professionnelle

Situation professionnelle	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=19270	(%) n=53072	(%) n=65956
Activité rémunérée continue	27.9	28.7	41.8
Activité rémunérée intermittente	15.7	13.2	5.9
Chômage	18.3	25.8	19.6
Etudiant, élève, stage non rémunéré	23.5	4.5	3.8
Retraité	0.2	1.6	7.4
Autre inactif	14.4	26.1	21.5
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	91.4	91.5	93.0

Répartition suivant le niveau d'études

Niveau d'études	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=17790	(%) n=46207	(%) n=54758
Pas terminé le primaire	0.3	0.8	0.7
Niveau primaire	3.5	5.5	6.7
Niveau BEPC	18.5	16.4	15.0
Niveau BEP, CAP	45.5	47.7	47.2
Niveau Bac	21.8	17.8	14.3
Niveau Bac+2	6.4	6.5	8.0
Niveau au-delà Bac+2	3.9	5.3	8.2
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	84.4	79.7	77.2

3. Origine et ancienneté de la prise en charge

Répartition suivant l'origine de la prise en charge

Origine de la prise en charge	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=18992	(%) n=53625	(%) n=68172
Le patient lui-même	19.1	46.0	22.9
Les proches (familles/amis)	9.1	7.3	5.3
Médecin de ville	3.7	10.1	10.2
CSST, assimilé	0.9	6.6	0.3
structures de RDR	0.5	1.3	0.6
Structure spécialisée en alcoologie	0.4	1.0	4.7
Equipe de liaison	0.7	2.8	1.7
Autre hôpital/autre sanitaire	2.9	5.9	9.6
Institutions et services soc	4.0	4.0	10.8
Obligation de soins	15.9	6.6	18.1
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencie	10.5	2.7	0.0
Justice : classement avec orientation	16.6	1.4	0.0
Autre mesure judiciaire ou administrative	12.0	2.1	12.2
Milieu scolaire/Universitaire	2.2	0.8	0.0
Autre	1.6	1.5	3.5
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	90.1	92.5	96.1

Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure

Prise en charge antérieure	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=15509	(%) n=43416	(%) n=2393
Jamais été pris en charge	77.7	37.8	31.6
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	16.2	31.5	39.1
Suivi actuellement	6.1	30.7	29.3
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	73.6	74.9	3.4

4. Produits utilisés

Répartition selon les produits consommés

Produit	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=20635	n=55391	n=57639
Alcool	23.2	37.9	79.3
Tabac	51.4	57.0	70.6
Cannabis	98.9	39.8	15.7
Benzodiazépines	0.7	7.0	0.8
Autres hypnot. et tranquillisants	0.2	0.8	0.3
Héroïne	3.0	44.7	3.9
Autres opiacés	0.2	4.0	0.3
Buprénorphine haut dosage	0.4	10.2	0.4
Méthadone	0.1	4.4	0.2
Cocaïne	6.5	21.1	3.1
Crack	0.4	3.4	0.2
MDMA et dérivés	2.2	3.6	0.4
Amphétamines	0.8	1.5	0.2
Autres stimulants	0.1	0.1	0.1
LSD	1.5	2.3	0.3
Champignons hallucinogènes	0.2	0.1	0.1
Autres hallucinogènes	0.1	0.2	0.0
Colles et solvants	0.2	0.6	0.1
Autres produits	1.3	2.3	1.4
Antidépresseurs	0.2	0.7	0.4
Barbituriques	0.1	0.3	0.1
Pas de produit consommé	2.1	4.5	18.7
Jeux ou cyberaddiction	0.2	0.7	.
Trouble léger du comportement alimentaire	0.1	0.3	.
Autre addiction sans produit	0.0	0.2	.
Total*	194.2	247.7	196.5
Taux de réponse	97.9	95.5	81.3

*Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits. Les totaux peuvent donc être supérieurs à 100.

Répartition suivant le premier produit consommé

Produit1	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=20341	n=53391	n=51692
Alcool1	0.0	24.4	81.8
Tabac1	0.0	5.3	10.0
Cannabis1	100.0	6.9	4.1
Benzodiazépines1	0.0	2.2	0.2
Autres hypnot. et tranquillisants1	0.0	0.2	0.1
Héroïne1	0.0	39.3	1.9
Autres opiacés1	0.0	2.5	0.1
Buprénorphine haut dosage1	0.0	6.0	0.1
Méthadone1	0.0	1.9	0.1
Cocaïne1	0.0	6.0	0.2
Crack1	0.0	1.8	0.0
MDMA et dérivés1	0.0	0.4	0.0
Amphétamines1	0.0	0.2	0.0
Autres stimulants1	0.0	0.0	0.0
LSD1	0.0	0.2	0.0
Champignons hallucinogènes1	0.0	0.0	0.0
Autres hallucinogènes1	0.0	0.1	0.0
Colles et solvants1	0.0	0.2	0.0
Autres produits1	0.0	1.1	1.2
Antidépresseurs1	0.0	0.2	0.1
Barbituriques1	0.0	0.1	0.0
Jeux ou cyberaddiction1	0.0	0.5	.
Trouble léger du comportement alimentaire1	0.0	0.2	.
Autre addiction sans produit1	0.0	0.2	.
Total*1	100.0	100.0	99.9
Taux de réponse1	96.5	92.1	72.9
Pas de produit consommé1	2.6	5.0	0.9

Répartition suivant le deuxième produit consommé

Produit ²	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=8672	n=33077	n=30680
Alcool ²	40.4	12.1	8.1
Tabac ²	37.9	13.7	79.6
Cannabis ²	0.0	31.1	8.0
Benzodiazépines ²	0.8	4.2	0.5
Autres hypnot. et tranquillisants ²	0.2	0.4	0.1
Héroïne ²	4.4	7.4	1.1
Autres opiacés ²	0.1	1.6	0.1
Buprénorphine haut dosage ²	0.4	4.5	0.3
Méthadone ²	0.1	2.5	0.1
Cocaïne ²	8.7	15.7	1.1
Crack ²	0.6	1.5	0.0
MDMA et dérivés ²	1.8	1.5	0.1
Amphétamines ²	0.7	0.6	0.0
Autres stimulants ²	0.1	0.1	0.0
LSD ²	1.1	0.9	0.0
Champignons hallucinogènes ²	0.2	0.0	0.0
Autres hallucinogènes ²	0.1	0.1	
Colles et solvants ²	0.2	0.4	0.0
Autres produits ²	1.4	0.9	0.2
Antidépresseurs ²	0.3	0.4	0.3
Barbituriques ²	0.1	0.1	0.0
Jeux ou cyberaddiction ²	0.1	0.1	
Trouble léger du comportement alimentaire ²	0.0	0.0	
Autre addiction sans produit ²	0.0	0.0	
Total* ²	99.8	99.9	99.9
Taux de réponse ²	41.2	57.0	43.3

Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

Utilisation de la voie intraveineuse	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=13990	n=46072	n=7926
Oui, au cours du mois passé	0.7	15.5	9.0
Oui avant (pas dans le mois)	2.1	25.0	10.2
Jamais	97.2	59.5	80.7
Total	100.0	100.0	100.0
Taux de réponse	66.4	79.5	11.2

5. Traitements de substitution

Répartition suivant les traitements de substitution

Traitement de substitution	groupe "cannabis" (%) n=.	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=50313	groupe "CCAA" (%) n=69778
Non	.	41.9	98.9
Oui, Méthadone	.	30.1	0.4
Oui, Subutex	.	26.8	0.8
Oui, autre	.	1.2	0.0
Total	.	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	.	86.8	98.4

Répartition suivant la durée des traitements de substitution

Ancienneté du traitement de substitution	groupe "cannabis" (%) n=.	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=16675	groupe "CCAA" (%) n=13
depuis moins de 6 mois	.	17.9	46.2
de 6 mois à 1 an	.	10.5	.
de 1 an à 2 ans	.	14.3	7.7
de 2 à 5 ans	.	25.6	15.4
depuis plus de 5 ans	.	31.7	30.8
Total	.	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	.	57.0	0.0

Répartition suivant les autres traitements

Autre traitement	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
Acamprosate	12.9	6.6	28.0
Naltrexone	12.1	4.3	12.5
Antabuse	12.6	4.1	5.9
Substitut nicotiniques	12.6	3.9	9.2
Bupropion	12.4	3.9	5.8
Anxiolytiques	52.8	61.7	71.3
Hypnotiques	27.4	30.7	5.0
Antidépresseurs	54.2	45.8	51.2
Neuroleptiques	50.8	32.6	19.9
Au moins un traitement cité	6.4	17.7	15.3
Aucun traitement cité	85.8	76.1	3.1

6. Sérologies VIH et VHC

Répartition suivant la sérologie VIH

Sérologie VIH	groupe "cannabis" (%) n=3825	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=28800	groupe "CCAA" (%) n=3768
Sérologie VIH positive	2.9	5.0	2.9
Sérologie VIH négative	97.1	95.0	97.1
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	18.2	49.7	5.3

Répartition suivant la sérologie VHC

Sérologie VHC	groupe "cannabis" (%) n=3450	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=28683	groupe "CCAA" (%) n=3717
Sérologie VHC positive	5.5	26.6	13.5
Sérologie VHC négative	94.5	73.4	86.5
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	16.4	49.5	5.2

Répartition suivant la vaccination contre l'hépatite B

Sérologie VHB	groupe "cannabis" (%) n=6508	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=25449	groupe "CCAA" (%) n=2672
Vaccination VHB Complète	54.6	52.4	44.1
Vaccination VHB Incomplète	45.4	47.6	55.9
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	30.9	43.9	3.8

7. Hospitalisation et tentative de suicide

Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	groupe "cannabis" (%) n=2991	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=12639	groupe "CCAA" (%) n=2932
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	24.0	32.1	18.2
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	76.0	67.9	81.8
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	59.2	68.0	22.7

Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie

Nombre d'hospitalisations	groupe "cannabis" (%) n=2275	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=8581	groupe "CCAA" (%) n=372
une hospitalisation	21.5	35.7	49.2
2 ou 3 hospitalisations	70.8	48.2	34.9
4 hospitalisations et plus	7.8	16.2	15.9
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	76.1	67.9	12.7

Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	groupe "cannabis" (%) n=11907	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=37238	groupe "CCAA" (%) n=1830
A déjà fait une tentative de suicide	22.2	26.9	17.0
N'a jamais fait de tentatives de suicide	77.8	73.1	83.0
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	56.5	64.2	2.6

Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide

Nombre de tentatives de suicide	groupe "cannabis" (%) n=2127	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=7328	groupe "CCAA" (%) n=228
une TS	26.4	38.5	59.2
deux ou trois TS	67.5	48.5	32.0
plus de 4 TS	6.2	13.0	8.8
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	80.5	73.3	73.1

8. Incarcération

Répartition suivant les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=17409	n=46008	n=20643
A déjà été incarcéré	25.9	39.5	23.2
N'a jamais été incarcéré	74.1	60.5	76.8
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	82.6	79.3	29.1

Répartition suivant le nombre d'incarcérations

Nombre d'incarcérations	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=2693	n=12123	n=327
une incarcération	54.0	41.2	55.7
2 ou 3 incarcérations	26.6	28.5	30.3
4 incarcérations et plus	19.3	30.3	14.1
Total	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	59.7	66.7	6.8

9. Tableaux complémentaires

Répartition suivant le premier produit consommé du mode de consommation habituel parmi les personnes du groupe opiacés, cocaïne et autres substa

Produit1	Injecté (%)	Fumé/inhalé (%)	Mangé/bu (%)	Sniffé (%)	Autre (%)	Total utile (%)	NSP/NR (%)
Alcool1 (n=13018)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
Tabac1 (n=2654)	0.0	99.1	0.7	0.1	0.1	100.0	6.3
Cannabis1 (n=3342)	0.0	98.7	1.2	0.0	0.0	100.0	9.2
Benzodiazépines1 (n=1017)	1.9	0.0	92.7	2.2	3.2	100.0	13.8
Autres hypnot. et tranquillisants1 (n=105)	1.9	0.0	91.4	2.9	3.8	100.0	11.8
Antidépresseurs1 (n=88)	0.0	0.0	93.2	3.4	3.4	100.0	20.7
Barbituriques1 (n=22)	0.0	0.0	90.9	9.1	0.0	100.0	33.3
Héroïne1 (n=18882)	24.4	15.1	1.5	58.0	0.9	100.0	10.0
Autres opiacés1 (n=1181)	42.9	3.9	43.2	6.8	3.2	100.0	13.0
Buprénorphine haut dosage1 (n=2762)	41.8	3.9	29.6	22.4	2.3	100.0	13.7
Méthadone1 (n=857)	1.8	4.9	91.7	0.6	1.1	100.0	15.0
Cocaïne1 (n=2887)	18.3	16.7	2.1	62.5	0.4	100.0	9.8
Crack1 (n=884)	4.0	92.6	0.9	2.5	0.0	100.0	9.9
MDMA et dérivés1 (n=153)	0.7	5.2	86.3	4.6	3.3	100.0	26.4
Amphétamines1 (n=89)	12.4	6.7	56.2	22.5	2.2	100.0	19.1
Autres stimulants1 (n=8)	0.0	12.5	62.5	12.5	12.5	100.0	38.5
LSD1 (n=100)	3.0	22.0	66.0	7.0	2.0	100.0	19.4
Champignons hallucinogènes1 (n=4)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	42.9
Autres hallucinogènes1 (n=27)	3.7	55.6	22.2	14.8	3.7	100.0	28.9
Colles ou solvant1 (n=101)	0.0	77.2	3.0	14.9	5.0	100.0	13.7
Autres produits1 (n=298)	11.1	17.8	33.2	5.4	32.6	100.0	49.7

Répartition suivant le premier produit consommé du type d'usage parmi les personnes du groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Produit1	Usage à risque (%)	Usage nocif (%)	Dépendance (%)	Total utile (%)	NSP/NR (%)
Alcool1 (n=13018)	14.6	17.7	67.7	100.0	11.2
Tabac1 (n=2654)	4.6	18.0	77.4	100.0	5.8
Cannabis1 (n=3342)	23.2	22.1	54.7	100.0	12.3
Benzodiazépines1 (n=1017)	8.7	10.8	80.5	100.0	16.9
Autres hypnot. et tranquillisants1 (n=105)	8.9	15.8	75.2	100.0	15.1
Antidépresseurs1 (n=88)	6.3	13.8	80.0	100.0	27.9
Barbituriques1 (n=22)	19.2	7.7	73.1	100.0	21.2
Héroïne1 (n=18882)	5.1	5.0	89.9	100.0	15.7
Autres opiacés1 (n=1181)	4.9	5.2	89.9	100.0	15.6
Buprénorphine haut dosage1 (n=2762)	4.8	6.5	88.8	100.0	19.2
Méthadone1 (n=857)	5.8	2.8	91.3	100.0	23.2
Cocaïne1 (n=2887)	20.1	24.0	55.9	100.0	18.4
Crack1 (n=884)	10.6	16.6	72.8	100.0	14.5
MDMA et dérivés1 (n=153)	24.6	34.8	40.6	100.0	33.7
Amphétamines1 (n=89)	28.4	37.0	34.6	100.0	26.4
Autres stimulants1 (n=8)	33.3	50.0	16.7	100.0	53.8
LSD1 (n=100)	27.5	31.3	41.3	100.0	35.5
Champignons hallucinogènes1 (n=4)	0.0	42.9	57.1	100.0	0.0
Autres hallucinogènes1 (n=27)	43.5	17.4	39.1	100.0	39.5
Colles ou solvant1 (n=101)	33.3	18.4	48.3	100.0	25.6
Autres produits1 (n=298)	10.0	16.6	73.4	100.0	54.2

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSST en 2009 suivant le sexe et les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	CSST Cannabis (%)		CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	22.6	33.5	30.3	37.9	16.1	24.9
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	77.4	66.5	69.7	62.1	83.9	75.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	<i>58.6</i>	<i>63.1</i>	<i>67.7</i>	<i>69.2</i>	<i>22.7</i>	<i>23.0</i>

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSST en 2009 suivant le sexe et les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	CSST Cannabis (%)		CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà fait une tentative de suicide	20.4	34.7	23.9	37.0	58.8	74.0
N'a jamais fait de tentatives de suicide	79.6	65.3	76.1	63.0	41.2	26.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	56.2	59.0	64.0	65.1	5.3	7.7

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSST en 2009 suivant le sexe et les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	CSST Cannabis (%)		CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà été incarcéré	27.6	13.0	45.6	18.4	28.4	3.7
N'a jamais été incarcéré	72.4	87.0	54.4	81.6	71.6	96.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	83.1	79.4	79.6	78.5	29.8	26.6

Prévalence déclarée du VIH et du VHC parmi les personnes ayant déjà utilisé de la voie intraveineuse (actuellement ou auparavant)

Sérologie	CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	VIH n=12096	VHC n=12430	VIH n=166	VHC n=179
Sérologie positive déclarée	7.7	48.5	4.2	39.1
Sérologie négative déclarée	92.3	51.5	95.8	60.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Taux de réponse</i>	67.7	69.6	14.4	15.5