



Pôle « indicateurs »

RECAP

(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)

Tableaux statistiques

Présentation de RECAP

Objectif du recueil

RECAP est un recueil de données continu conçue pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation des services. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

Modalités du recueil

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT (cf. spécifications techniques). Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

Critères d'inclusion

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. La notion d'acte est ici très large, l'accueil pouvant être considéré comme un acte. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont également incluses dans le recueil.

Couverture du recueil

En 2010, environ 88 000 patients vus dans 150 CSAPA (ex CSST) ambulatoires distincts, 18 centres thérapeutiques résidentiels et 11 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête. Cette année le nombre des CSAPA en ambulatoire participants au RECAP a pour la première fois baissé par rapport aux années précédentes. Le taux de couverture reste néanmoins plus de 70% pour les CSAPA en ambulatoire, 44% pour les CSAPA avec hébergement et 69% pour des CSAPA en milieu pénitentiaire. Exceptionnellement, cette année les données sur les CSAPA (ex CCAA) ne sont pas disponibles.

Informations recueillies

1. Nombre de personnes prises en charge
2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge
3. Prise en charge
4. Produits utilisés
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

Répartition en groupes

Dans l'ensemble des personnes accueillies dans les CSAPA (ex CSST) deux populations se distinguent, avec un premier groupe, majoritaire, qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 36 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne, et un deuxième groupe constitué de personnes dont l'âge moyen est de 26 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis. Les données calculées sur l'ensemble de ces deux populations très différentes n'ont pas beaucoup de signification. Les caractéristiques moyennes qui se dégagent dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il paraît plus pertinent aujourd'hui pour les CSAPA de fournir des résultats séparés pour chacun de ces deux groupes.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** » et le deuxième par « **groupe cannabis** ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie du groupe cannabis et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Il peut être noté que les personnes de ce deuxième groupe peuvent être consommatrices de cannabis soit parce que cette substance est mentionnée en produit autre que le produit n°1, soit pour des personnes ayant un produit autre que le cannabis à l'origine de la prise en charge et/ou suivant un traitement de substitution aux opiacés.

L'information sur les produits est absente pour environ 15 % des personnes vues dans les CSAPA (ex CSST). Les caractéristiques principales de ce groupe ont été comparées à celles de chacun des deux groupes et à celles de l'ensemble des personnes vues dans les CSST. Les caractéristiques des personnes « sans produits » sont plus proches de celles de l'ensemble des personnes que de celles de l'un ou l'autre des deux groupes. Il peut donc être considéré que ces personnes « sans produits » se répartissent entre « groupe cannabis » et « groupes opiacé/cocaïne et autres produits » comme les personnes dont on connaît les produits consommés.

Pour le détail des questions RECAP voir les documents en ligne :

- Noyau commun de questions pour les structures spécialisées en addictologie

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_noy.doc

- Exemple de fiche patient

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_pat.doc

RECAP 2010

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2010/OFDT

1. Nombre de personnes prises en charge incluses dans l'enquête

Répartition suivant les produits en cause

Groupe de patients	Effectif	Répartition en % entre les deux groupes de patients CSAPA avec mention d'un produit
CSAPA (ex CSST), groupe cannabis	18 951	24.5
CSAPA (ex CSST), groupe opiacés, cocaïne et autres	58 266	75.5
CSAPA (ex CSST), total avec mention de produits	77 217	100.0
CSAPA (ex CSST), sans mentions de produits	10 334	
CSAPA (ex CSST), ensemble	87 551	

CSAPA (ex CCAA) les données 2010 ne sont pas disponibles

2. 2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge

Répartition suivant le sexe

Sexe	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe CCAA (%)
	n=18949	n=58259	
Homme	88.1	77.8	
Femme	11.9	22.2	
Total	100.0	100.0	
Taux de réponse	100.0	100.0	

Age moyen

	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	n=18942	n=58227	
Age moyen	25.9	35.9	

Age moyen et âge moyen de début de consommation suivant le premier produit consommé pour le groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Age	Age moyen	Age moyen de début de consommation
	n=58237	n=42634
Alcool1	40.4	20.4
Tabac1	36.4	16.1
Cannabis1*	34.2	15.9
Benzodiazépines1	38.7	24.8
Autres hypnot. et tranquillisants1	34.7	23.9
Antidépresseurs1	39.2	24.7
Barbituriques1	35.5	21.8
Héroïne1	32.9	21.0
Autres opiacés1	38.0	26.1
Buprénorphine haut dosage1	36.3	27.0
Méthadone1	34.8	28.4
Cocaïne1	34.3	23.1
Crack1	39.9	26.9
MDMA et dérivés1	32.8	21.9
Amphétamines1	31.2	20.8
Autres stimulants1	33.7	21.3
LSD1	25.9	16.2
Champignons hallucinogènes1	36.9	18.3
Autres hallucinogènes1	25.4	17.3
Colles et solvants1	29.9	16.5
Autres produits1	36.3	23.2
Jeux ou cyberaddiction1	32.2	21.1
Trouble léger du comportement alimentaire1	34.0	21.0
Autre addiction sans produit1	32.9	25.0

*Dans le groupe Opiacés, cocaïne et autres produits, le cannabis consommé en produit n°1 correspond aux cas de personnes soit sous traitement de substitution aux opiacés, soit ayant un produit autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge.

Répartition suivant l'âge

Age	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=18942	(%) n=58227	
moins de 20 ans	22.7	2.9	
de 20 à 24 ans	29.6	10.8	
de 25 à 29 ans	21.4	17.5	
de 30 à 39 ans	18.9	33.7	
de 40 à 49 ans	6.1	25.1	
de 50 à 59 ans	1.2	8.0	
plus de 60 ans	0.1	2.0	
Total	100.0	100.0	0.0
Taux de réponse	100.0	99.9	

Répartition suivant et le nombre d'enfants

Nombre d'enfants	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=17587	(%) n=53225	
Sans enfant	80.7	56.2	
1 enfant	10.0	20.6	
2 enfants ou plus	9.3	23.2	
Total	100.0	100.0	0.0
Taux de réponse	92.8	91.3	

Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle

Catégorie socio professionnelle	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=16497	(%) n=50278	
Agriculteur	0.2	0.3	
Artisan commerçant	2.0	3.4	
Cadre Prof Libérale	1.5	2.8	
Profession intermédiaire	2.1	3.1	
Employé	23.5	28.8	
Ouvrier	25.2	29.3	
Retraité	0.2	1.4	
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	45.2	30.9	
Total	100.0	100.0	
Taux de réponse	87.1	86.3	

Répartition suivant les conditions de logement

Condition de logement	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=17417	(%) n=52281	
Vit seul	22.1	36.1	
Vit avec ses parents	49.0	21.8	
Vit seul(e) avec enfant(s)	1.7	4.1	
Vit avec un conjoint seulement	9.4	14.8	
Vit avec conjoint et enfant(s)	9.5	15.0	
Vit avec des amis	2.1	3.3	
Autre	6.1	4.9	
Total	100.0	100.0	
Taux de réponse	91.9	89.7	

Répartition suivant le type de logement

Type de logement	groupe "cannabis" (%) n=17758	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=55188	groupe "CCAA" (%)
Durable indépendant	37.8	52.7	
Durable Chez des proches	46.8	21.4	
Durable en institution	1.4	1.5	
Provisoire chez des proches	4.4	6.5	
Provisoire en institution	3.8	5.3	
Autre Provisoire	2.0	3.9	
Etablissement pénitentiaire	1.7	2.5	
SDF	2.1	6.3	
Total	100.0	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	93.7	94.7	

Répartition suivant l'origine des ressources

Origine des ressources	groupe "cannabis" (%) n=16654	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=51095	groupe "CCAA" (%)
Revenus d'emplois (y compris retraites et pensions inv.)	39.6	39.4	
ASSEDIC	10.3	12.9	
RMI	7.4	19.2	
AAH	3.3	8.4	
Autres prestations sociales	2.0	3.1	
Ressources provenant d'un tiers	25.3	5.9	
Autres ressources (y compris sans revenus)	12.2	11.2	
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	87.9	87.7	

Répartition suivant la situation professionnelle

Situation professionnelle	groupe "cannabis" (%) n=17240	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=53237	groupe "CCAA" (%)
Activité rémunérée continue	26.1	29.0	
Activité rémunérée intermittente	15.5	13.1	
Chômage	19.8	26.3	
Etudiant, élève, stage non rémunéré	23.4	4.5	
Retraité	0.3	1.9	
Autre inactif	15.0	25.3	
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	91.0	91.4	

Répartition suivant le niveau d'études

Niveau d'études	groupe "cannabis" (%) n=15898	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=46532	groupe "CCAA" (%)
Pas terminé le primaire	0.3	0.8	
Niveau primaire	4.0	5.3	
Niveau BEPC	18.7	16.6	
Niveau BEP, CAP	44.2	46.4	
Niveau Bac	22.3	18.2	
Niveau Bac+2	6.3	7.0	
Niveau au-delà Bac+2	4.3	5.8	
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	83.9	79.9	

3. Origine et ancienneté de la prise en charge

Répartition suivant l'origine de la prise en charge

Origine de la prise en charge	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=17153	n=54267	
Le patient lui-même	20.6	46.0	
Les proches (familles/amis)	9.8	7.4	
Médecin de ville	4.1	9.4	
CSST, assimilé	1.3	6.4	
structures de RDR	0.5	2.3	
Structure spécialisée en alcoologie	0.4	1.1	
Equipe de liaison	1.2	3.0	
Autre hôpital/autre sanitaire	3.0	5.5	
Institutions et services soc	4.0	3.6	
Obligation de soins	18.3	7.2	
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencie	8.4	2.8	
Justice : classement avec orientation	15.2	1.1	
Autre mesure judiciaire ou administrative	9.6	2.1	
Milieu scolaire/Universitaire	2.3	0.6	
Autre	1.4	1.5	
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	90.5	93.1	

Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure

Prise en charge antérieure	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=14410	n=44520	
Jamais été pris en charge	77.0	39.8	
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	14.7	28.9	
Suivi actuellement	8.3	31.2	
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	76.0	76.4	

4. Produits utilisés

Répartition selon les produits consommés

Produit	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=18269	(%) n=4090	
Alcool	24.1	40.2	
Tabac	51.9	57.2	
Cannabis	99.1	38.7	
Benzodiazépines	0.6	6.5	
Autres hypnot. et tranquillisants	0.2	0.8	
Héroïne	3.2	43.5	
Autres opiacés	0.2	3.9	
Buprénorphine haut dosage	0.4	9.2	
Méthadone	0.1	4.8	
Cocaïne	6.6	19.5	
Crack	0.5	3.0	
MDMA et dérivés	2.0	3.0	
Amphétamines	0.7	1.4	
Autres stimulants	0.1	0.3	
LSD	1.3	2.2	
Champignons hallucinogènes	0.1	0.2	
Autres hallucinogènes	0.1	0.8	
Colles et solvants	0.3	0.8	
Autres produits	1.2	2.1	
Antidépresseurs	0.2	0.9	
Barbituriques	0.1	0.4	
Pas de produit consommé	2.4	3.7	
Jeux ou cyberaddiction	0.4	0.8	
Trouble léger du comportement alimentaire	0.1	0.4	
Autre addiction sans produit	0.1	0.4	
Total*	196.2	244.6	0.0
Taux de réponse	97.6	96.3	

*Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits. Les totaux peuvent donc être supérieurs à 100.

Répartition suivant le premier produit consommé

Produit1	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=18269	(%) n=54477	
Alcool1	0.0	26.7	
Tabac1	0.0	4.9	
Cannabis1	100.0	7.5	
Benzodiazépines1	0.0	1.9	
Autres hypnot. et tranquillisants1	0.0	0.2	
Héroïne1	0.0	38.0	
Autres opiacés1	0.0	2.5	
Buprénorphine haut dosage1	0.0	5.3	
Méthadone1	0.0	1.9	
Cocaïne1	0.0	5.6	
Crack1	0.0	1.6	
MDMA et dérivés1	0.0	0.3	
Amphétamines1	0.0	0.2	
Autres stimulants1	0.0	0.0	
LSD1	0.0	0.2	
Champignons hallucinogènes1	0.0	0.0	
Autres hallucinogènes1	0.0	0.1	
Colles et solvants1	0.0	0.2	
Autres produits1	0.0	1.1	
Antidépresseurs1	0.0	0.2	
Barbituriques1	0.0	0.1	
Pas de produit consommé1	3.1	4.5	
Jeux ou cyberaddiction1	0.0	0.6	
Trouble léger du comportement alimentaire1	0.0	0.3	
Autre addiction sans produit1	0.0	0.3	
Total avec produit1	100.0	100.0	0.0
Taux de réponse1	96.4	93.5	

Répartition suivant le deuxième produit consommé

Produit ²	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=1156	(%) n=2771	
Alcool ²	40.6	12.1	
Tabac ²	38.7	16.8	
Cannabis ²	0.0	29.3	
Benzodiazépines ²	0.7	4.0	
Autres hypnot. et tranquillisants ²	0.2	0.4	
Héroïne ²	4.5	7.2	
Autres opiacés ²	0.2	1.5	
Buprénorphine haut dosage ²	0.3	4.0	
Méthadone ²	0.1	2.9	
Cocaïne ²	8.6	14.2	
Crack ²	0.7	1.2	
MDMA et dérivés ²	1.5	1.2	
Amphétamines ²	0.4	0.7	
Autres stimulants ²	0.0	0.1	
LSD ²	1.0	1.1	
Champignons hallucinogènes ²	0.1	0.1	
Autres hallucinogènes ²	0.2	0.9	
Colles et solvants ²	0.3	0.6	
Autres produits ²	1.1	0.7	
Antidépresseurs ²	0.3	0.5	
Barbituriques ²	0.0	0.3	
<i>Pas de produit consommé²</i>	6.1	4.8	
Jeux ou cyberaddiction ²	0.1	0.1	
Trouble léger du comportement alimentaire ²	0.0	0.0	
Autre addiction sans produit ²	0.0	0.1	
Total avec produit ²	99.7	99.9	0.0
Taux de réponse ²	42.0	57.7	

Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

Utilisation de la voie intraveineuse	groupe "cannabis"	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
	(%) n=11895	(%) n=45160	
Oui, au cours du mois passé	0.8	14.8	
Oui avant (pas dans le mois)	2.5	23.8	
Jamais	96.7	61.4	
Total	100.0	100.0	
Taux de réponse	62.8	77.5	

5. Traitements de substitution

Répartition suivant les traitements de substitution

Traitement de substitution	groupe "cannabis" (%) n=.	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=50077	groupe "CCAA" (%)
Non	.	43.0	
Oui, Méthadone	.	30.0	
Oui, Subutex	.	25.6	
Oui, autre	.	1.5	
Total	.	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	.	85.9	

Répartition suivant la durée des traitements de substitution

Ancienneté du traitement de substitution	groupe "cannabis" (%) n=.	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=13217	groupe "CCAA" (%)
depuis moins de 6 mois	.	18.1	
de 6 mois à 1 an	.	9.5	
de 1 an à 2 ans	.	13.5	
de 2 à 5 ans	.	26.1	
depuis plus de 5 ans	.	32.7	
Total	.	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	.	46.3	

Répartition suivant les autres traitements

Autre traitement	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "CCAA" (%)
Acamprosate	0.9	3.2	
Naltrexone	0.3	1.0	
Antabuse	0.6	0.7	
Substitut nicotiniques	0.8	1.6	
Bupropion	0.3	0.7	
Anxiolytiques	50.9	61.7	
Hypnotiques	18.9	29.3	
Antidépresseurs	46.5	43.2	
Neuroleptiques	46.3	29.7	
Au moins un traitement cité	6.2	18.1	
Aucun traitement cité	88.5	77.9	

6. Sérologies VIH et VHC

Répartition suivant la sérologie VIH

Sérologie VIH	groupe "cannabis" (%) n=3727	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=28396	groupe "CCAA" (%)
Sérologie VIH positive	2.1	4.4	
Sérologie VIH négative	97.9	95.6	
Total	100.0	100.0	100.0
Taux de réponse	19.7	48.7	

Répartition suivant la sérologie VHC

Sérologie VHC	groupe "cannabis" (%) n=3415	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=28235	groupe "CCAA" (%)
Sérologie VHC positive	5.3	24.8	
Sérologie VHC négative	94.7	75.2	
Total	100.0	100.0	
Taux de réponse	18.0	48.5	

Répartition suivant la vaccination contre l'hépatite B

Sérologie VHB	groupe "cannabis" (%) n=7243	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=29508	groupe "CCAA" (%)
Vaccination VHB Complète	54.1	55.6	
Vaccination VHB Incomplète	45.9	44.4	
Total	100.0	100.0	
Taux de réponse	38.2	50.6	

7. Hospitalisation et tentative de suicide

Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	groupe "cannabis" (%) n=12039	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=41450	groupe "CCAA" (%) n=16130
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	29.6	37.2	18.2
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	70.4	62.8	81.8
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	63.5	71.1	22.7

Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie

Nombre d'hospitalisations	groupe "cannabis" (%) n=3113	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=11906	groupe "CCAA" (%) n=372
une hospitalisation	15.5	27.0	49.2
2 ou 3 hospitalisations	77.3	58.6	34.9
4 hospitalisations et plus	7.3	14.5	15.9
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	87.5	77.1	12.7

Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	groupe "cannabis" (%) n=11534	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=39224	
A déjà fait une tentative de suicide	27.9	32.5	
N'a jamais fait de tentatives de suicide	72.1	67.5	
Total	100.0	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	60.9	67.3	

Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide

Nombre de tentatives de suicide	groupe "cannabis" (%) n=2964	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=10539	groupe "CCAA" (%)
une TS	25.2	34.7	
deux ou trois TS	68.9	53.5	
plus de 4 TS	5.9	11.8	
Total	100.0	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	92.0	82.7	

8. Incarcération

Répartition suivant les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	groupe "cannabis" (%) n=16258	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=47643	groupe "CCAA" (%)
A déjà été incarcéré	32.6	43.9	
N'a jamais été incarcéré	67.4	56.1	
Total	100.0	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	85.8	81.8	

Répartition suivant le nombre d'incarcérations

Nombre d'incarcérations	groupe "cannabis" (%) n=2870	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=12820	groupe "CCAA" (%)
une incarcération	47.8	38.1	
2 ou 3 incarcérations	26.0	26.6	
4 incarcérations et plus	26.1	35.3	
Total	100.0	100.0	0.0
<i>Taux de réponse</i>	54.2	61.3	

9. Tableaux complémentaires

Répartition suivant le premier produit consommé du mode de consommation habituel parmi les personnes du groupe opiacés, cocaïne et autres substa

Produit1	Injecté (%)	Fumé/inhalé (%)	Mangé/bu (%)	Sniffé (%)	Autre (%)	Total utile (%)	NSP/NR (%)
Alcool1 (n=14425)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
Tabac1 (n=2689)	0.0	98.5	0.7	0.0	0.8	100.0	5.4
Cannabis1 (n=3513)	0.0	99.0	0.9	0.0	0.1	100.0	7.1
Benzodiazépines1 (n=1055)	1.9	0.0	92.8	1.9	3.4	100.0	16.3
Autres hypnot. et tranquillisants1 (n=122)	2.8	0.0	93.5	0.9	2.8	100.0	12.3
Antidépresseurs1 (n=131)	7.5	0.0	80.6	7.5	4.3	100.0	29.0
Barbituriques1 (n=38)	7.9	0.0	60.5	31.6	0.0	100.0	28.3
Héroïne1 (n=20756)	22.8	15.9	0.8	59.9	0.6	100.0	8.6
Autres opiacés1 (n=1379)	42.5	4.8	42.2	7.4	3.0	100.0	11.6
Buprénorphine haut dosage1 (n=2899)	40.6	3.8	30.3	22.5	2.7	100.0	11.6
Méthadone1 (n=1051)	1.3	3.1	93.0	0.9	1.7	100.0	16.7
Cocaïne1 (n=3030)	17.8	15.8	1.2	65.0	0.3	100.0	9.5
Crack1 (n=838)	3.5	93.1	0.7	2.7	0.1	100.0	13.2
MDMA et dérivés1 (n=170)	0.9	1.8	88.2	7.3	1.8	100.0	35.3
Amphétamines1 (n=122)	16.7	9.3	53.7	16.7	3.7	100.0	11.5
Autres stimulants1 (n=18)	13.3	26.7	40.0	13.3	6.7	100.0	16.7
LSD1 (n=696)	0.4	89.7	8.6	0.7	0.4	100.0	3.6
Champignons hallucinogènes1 (n=14)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	85.7
Autres hallucinogènes1 (n=189)	0.5	3.2	95.8	0.5	0.0	100.0	5.0
Colles ou solvant1 (n=128)	0.0	78.1	7.3	12.5	2.1	100.0	25.0
Autres produits1 (n=566)	6.7	14.2	44.3	4.3	30.5	100.0	50.2

Répartition suivant le premier produit consommé du type d'usage parmi les personnes du groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Produit1	Usage à risque (%)	Usage nocif (%)	Dépendance (%)	Total utile (%)	NSP/NR (%)
Alcool1 (n=14425)	14.0	17.8	68.3	100.0	13.3
Tabac1 (n=2689)	4.1	12.0	83.9	100.0	8.0
Cannabis1 (n=3513)	22.0	25.0	52.9	100.0	11.2
Benzodiazépines1 (n=1055)	6.5	9.2	84.3	100.0	17.3
Autres hypnot. et tranquillisants1 (n=122)	11.5	15.4	73.1	100.0	14.8
Antidépresseurs1 (n=131)	7.9	20.2	71.9	100.0	32.1
Barbituriques1 (n=38)	25.6	12.8	61.5	100.0	26.4
Héroïne1 (n=20756)	5.0	4.5	90.6	100.0	17.3
Autres opiacés1 (n=1379)	3.4	5.4	91.1	100.0	15.9
Buprénorphine haut dosage1 (n=2899)	5.2	5.9	88.9	100.0	19.2
Méthadone1 (n=1051)	3.9	2.7	93.4	100.0	22.5
Cocaïne1 (n=3030)	22.0	24.3	53.7	100.0	20.0
Crack1 (n=838)	11.8	16.9	71.4	100.0	18.7
MDMA et dérivés1 (n=170)	26.5	27.5	46.1	100.0	40.0
Amphétamines1 (n=122)	19.6	27.5	52.9	100.0	16.4
Autres stimulants1 (n=18)	7.1	64.3	28.6	100.0	22.2
LSD1 (n=696)	27.9	27.6	44.5	100.0	13.5
Champignons hallucinogènes1 (n=14)	25.0	0.0	75.0	100.0	71.4
Autres hallucinogènes1 (n=189)	49.2	24.9	26.0	100.0	11.1
Colles ou solvant1 (n=128)	32.2	16.1	51.7	100.0	32.0
Autres produits1 (n=566)	20.3	12.5	67.2	100.0	52.1

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSST en 2009 suivant le sexe et les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	CSST Cannabis (%)		CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	28.4	37.7	35.8	42.3		
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	71.6	62.3	64.2	57.7		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0		
<i>Taux de réponse</i>	63.2	65.9	71.0	71.6		

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSST en 2009 suivant le sexe et les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	CSST Cannabis (%)		CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà fait une tentative de suicide	26.4	38.2	30.0	41.2		
N'a jamais fait de tentatives de suicide	73.6	61.8	70.0	58.8		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0		
<i>Taux de réponse</i>	<i>60.6</i>	<i>62.4</i>	<i>67.2</i>	<i>67.6</i>		

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSST en 2009 suivant le sexe et les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	CSST Cannabis (%)		CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà été incarcéré	34.3	18.8	49.4	24.3		
N'a jamais été incarcéré	65.7	81.2	50.6	75.7		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0		
<i>Taux de réponse</i>	<i>86.0</i>	<i>84.1</i>	<i>82.0</i>	<i>80.7</i>		

Prévalence déclarée du VIH et du VHC parmi les personnes ayant déjà utilisé de la voie intraveineuse (actuellement ou auparavant)

Sérologie	CSST opiacés cocaïne et autres substances (%)		CCAA (%)
	VIH n=11502	VHC n=11884	
Sérologie positive déclarée	7.2	47.0	
Sérologie négative déclarée	92.8	53.0	
Total	100.0	100.0	
<i>Taux de réponse</i>	<i>68.8</i>	<i>71.1</i>	