Pôle « indicateurs »

RECAP

(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)

Tableaux statistiques

Présentation de RECAP

Objectif du recueil

RECAP est un recueil de données continu conçue pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation des services. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

Modalités du recueil

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT (cf. spécifications techniques). Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

Critères d'inclusion

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. La notion d'acte est ici très large, l'accueil pouvant être considéré comme un acte. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont également incluses dans le recueil.

Couverture du recueil

En 2012, environ 126 000 patients vus dans 180 CSAPA ambulatoires distincts, 18 centres thérapeutiques résidentiels et 10 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête.

Informations recueillies

1. Nombre de personnes prises en charge
2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge
3. Prise en charge
4. Produits utilisés
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

Répartition en groupes

Dans l'ensemble des personnes accueillies dans les CSAPA, trois populations se distinguent, avec un premier groupe, majoritaire, qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 36 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne. Un deuxième groupe est constitué de personnes dont l'âge moyen est proche de 26 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis alors que le troisieme groupe comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 43 ans et qui ont un problème principal avec l'alcool. Les données calculées sur l'ensemble de ces trois populations très différentes n'ont pas beaucoup de signification. Les caractéristiques moyennes qui se dégagent dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il paraît plus pertinent aujourd'hui pour les CSAPA de fournir des résultats séparés pour chacun de ces trois groupes.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** » , le deuxième par « **groupe cannabis** » et le troisieme par « **groupe alcool** ». Il faut noter un changement introduit en 2012 par rapport au mode d'exploitation des données entre 2005 et 2011. Désormais ces critères d'inclusion/exclusion dans chacun des groupes s'appliquent à l'ensemble des CSAPA, qu'il soient d'anciens CSST spécialisés en drogues illicites ou d'anciens CCAA spécialisés en alcoologie. Auparavant le groupe "alcool" comprenait l'ensemble des personnes vues dans les ex CCAA et les deux groupes "cannabis" et "opiacés, cocaïne et autres substances" que personnes vues dans les ex CSST. Les données de 2012 ne sont pour cette raison plus exactement comparable aux données des années précédentes. La logique de la mise en place des CSAPA rendait inévitable l'introduction de ce changement.

Le critère d'inclusion dans le "**groupe cannabis**" est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe "**alcool**" comprend l'ensemble des personnes pour lesquelles l'alcool est indiqué comme produit n° 1 ou en l'absence de mention d'un produit consommé en produit à l'origine de la prise en charge, à l'exclusion des personnes qui suivent un traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe "**opiacés/cocaïne et autres substances"** comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie des groupe cannabis et alcool et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Il peut être noté que les personnes de ce groupe peuvent être consommatrices de cannabis ou d'alcool soit parce que cette substance est mentionnée en produit autre que le produit n°1, soit pour des personnes qui suivent un traitement de substitution aux opiacés.

Il faut noter un changement introduit en 2012 par rapport au mode d'exploitation des données entre 2005 et 2011. Désormais ces critères d'inclusion/exclusion dans chacun de ces trois groupes s'appliquent à l'ensemble des CSAPA, qu'il soient d'anciens CSST spécialisés en drogues illicites ou d'anciens CCAA spécialisés en alcoologie. Auparavant le groupe "alcool" comprenait l'ensemble des personnes vues dans les ex CCAA et les deux groupes "cannabis" et "opiacés, cocaïne et autres substances" que des personnes vues dans les ex CSST. Les données de 2012 ne sont pour cette raison plus exactement comparable aux données des années précédentes. La logique de la mise en place des CSAPA rendait inévitable l'introduction de ce changement.

L'information sur les produits est absente pour environ 10 % des personnes vus dans les CSAPA.

Pour le détail des questions RECAP voir les documents en ligne :
- Noyau commun de questions pour les structures spécialisées en addictologie
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_noy.doc
- Exemple de fiche patient
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_pat.doc

RECAP 2012

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2012/OFDT

1. Nombre de personnes prises en charge incluses dans l'enquête

Répartition suivant les produits en cause

Groupe de patients	Effectif	Répartition en % entre les trois groupes de patients
CSAPA groupe cannabis	22 963	18,1
CSAPA groupe opiacés, cocaïne et autres substances	49 144	38,8
CSAPA groupe alcool	54 566	43,1
CSAPA total avec mention de produits	**126 673**	**100,0**
CSAPA total sans mention de produits	12 806	

2. 2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge

Répartition suivant le sexe

Sexe	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe alcool (%)
	n=22942	n=49120	n=54488
Homme	86,0	77,6	76,6
Femme	14,0	22,4	23,4
Total	100,0	100,0	100,0

Taux de réponse

Age moyen

	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=22829	n=48921	n=54095
Age moyen	25,7	35,0	43,0

Age moyen et âge moyen de début de consommation suivant le premier produit consommé pour le groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Age	Age moyen	Age moyen de début de consommation
Alcool1	39,0	19,2
Tabac1	39,2	15,6
Cannabis1*	33,8	15,8
Benzodiazépines1	39,6	24,9
Autres hypnot. et tranquillisants1	39,3	26,1
Antidépresseurs1	36,2	23,4
Barbituriques1	40,2	24,8
Héroïne1	34,3	21,0
Autres opiacés1	38,4	26,4
Buprénorphine haut dosage1	35,7	25,9
Méthadone1	31,5	22,4
Cocaïne1	34,8	23,1
Crack1	40,2	26,9
MDMA et dérivés1	31,2	20,5
Amphétamines1	32,8	23,1
Autres stimulants1	35,2	26,6
LSD1	31,6	20,8
Champignons hallucinogènes1	31,4	18,7
Autres hallucinogènes1	35,2	22,2
Colles et solvants1	42,0	18,1
Autres produits1	36,1	24,5
Jeux d'argent1	39,0	26,5
Cyber addiction	23,6	20,2
Trouble léger du comportement alimentaire1	35,2	19,2
Autre addiction sans produit1	37,3	24,2

**Dans le groupe Opiacés, cocaïne et autres produits, le cannabis consommé en produit n°1 correspond aux cas de personnes soit sous traitement de substitution aux opiacés, soit ayant un produit autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge.*

Répartition suivant l'âge

Age	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=22829	n=48921	n=54095
moins de 20 ans	27,0	4,3	2,6
de 20 à 24 ans	27,1	9,8	5,3
de 25 à 29 ans	19,2	18,2	8,5
de 30 à 39 ans	18,4	35,1	23,0
de 40 à 49 ans	6,5	25,1	29,2
de 50 à 59 ans	1,5	6,5	21,4
plus de 60 ans	0,2	1,0	10,1
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	99,4	99,5	99,1

Répartition suivant et le nombre d'enfants

Nombre d'enfants	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=21570	n=45921	n=52698
Sans enfant	80,6	59,3	40,6
1 enfant	10,1	19,9	19,1
2 enfants ou plus	9,4	20,7	40,3
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*93,9*	*93,4*	*96,6*

Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle

Catégorie socio professionnelle	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=19590	n=42560	n=48495
Agriculteur	0,4	1,5	1,0
Artisan commerçant	2,5	4,1	4,7
Cadre Prof Libérale	1,3	2,1	5,4
Profession intermédiaire	1,8	2,7	4,1
Employé	21,9	26,4	33,4
Ouvrier	25,4	28,0	27,4
Retraité	0,2	0,6	6,1
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	46,4	34,5	17,8
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*85,3*	*86,6*	*88,9*

Répartition suivant les conditions de logement

Condition de logement	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=20572	n=44688	n=51191
Vit seul	20,1	34,6	36,9
Vit avec ses parents	49,5	23,2	12,9
Vit seul(e) avec enfant(s)	1,9	4,3	5,4
Vit avec un conjoint seulement	9,2	14,2	17,7
Vit avec conjoint et enfant(s)	10,6	14,2	20,1
Vit avec des amis	2,2	3,8	1,8
Autre	6,5	5,6	5,4
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*89,6*	*90,9*	*93,8*

Répartition suivant le type de logement

Type de logement	groupe "cannabis" (%) n=20968	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=46537	groupe "alcool" (%) n=51345
Durable indépendant	39,7	51,8	73,2
Durable Chez des proches	45,7	22,4	12,2
Durable en institution	1,6	1,4	1,6
Provisoire chez des proches	4,4	6,6	3,8
Provisoire en institution	3,7	5,4	3,9
Autre Provisoire	1,9	3,9	2,5
Etablissement pénitentiaire	1,5	2,2	0,7
SDF	1,5	6,2	2,2
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*91,3*	*94,7*	*94,1*

Répartition suivant l'origine des ressources

Origine des ressources	groupe "cannabis" (%) n=19677	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=43284	groupe "alcool" (%) n=49394
Revenus d'emplois (y compris retraites et pensions invalidité	39,3	37,3	55,9
ASSEDIC	9,7	12,0	11,6
RSA	7,6	20,6	14,5
AAH	3,1	8,6	6,0
Autres prestations sociales	1,4	3,1	1,8
Ressources provenant d'un tiers	22,3	7,3	2,7
Autres ressources (y compris sans revenus)	16,7	11,2	7,6
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*85,7*	*88,1*	*90,5*

Répartition suivant la situation professionnelle

Situation professionnelle	groupe "cannabis" (%) n=20706	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=44432	groupe "alcool" (%) n=50053
Activité rémunérée continue	26,1	28,4	41,9
Activité rémunérée intermittente	13,4	12,9	6,3
Chômage	18,8	26,7	20,9
Etudiant, élève, stage non rémunéré	26,5	5,1	3,1
Retraité	0,4	0,8	8,0
Autre inactif	14,7	26,0	19,8
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*90,2*	*90,4*	*91,7*

Répartition suivant le niveau d'études

Niveau d'études	groupe "cannabis" (%) n=18597	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=39510	groupe "alcool" (%) n=40413
Pas terminé le primaire	0,3	0,7	1,0
Niveau primaire	3,1	4,9	5,7
Niveau Brevet des collèges	19,3	18,1	14,5
Niveau BEP, CAP	42,3	46,5	44,5
Niveau Bac	24,0	17,7	15,2
Niveau Bac+2	6,3	6,6	9,3
Niveau au-delà Bac+2	4,6	5,5	9,7
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*81,0*	*80,4*	*74,1*

3. Origine et ancienneté de la prise en charge

Répartition suivant l'origine de la prise en charge

Origine de la prise en charge	groupe "cannabis" (%) n=18853	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=44719	groupe "alcool" (%) n=42910
Le patient lui-même	22,0	48,5	36,3
Les proches (familles/amis)	10,7	7,8	7,6
Médecin de ville	3,7	9,0	12,6
CSAPA, assimilé	0,8	7,0	1,2
structures de RDR	0,5	1,3	0,3
Structure spécialisée en alcoologie	0,4	0,8	3,2
Equipe de liaison en addictologie	1,3	1,4	3,8
Autre hôpital/autre sanitaire	2,9	5,0	9,7
Institutions et services soc	4,9	3,4	6,9
Obligation de soins	18,6	6,1	10,0
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencielle	7,4	2,1	1,0
Justice : classement avec orientation	11,9	1,7	2,4
Autre mesure judiciaire ou administrative	10,3	2,0	1,5
Milieu scolaire/Universitaire	3,0	2,0	0,9
Autre	1,7	1,8	2,6
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*82,1*	*91,0*	*78,6*

Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure

Prise en charge antérieure	groupe "cannabis" (%) n=15179	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=36039	groupe "alcool" (%) n=23553
Jamais été pris en charge	72,7	35,7	40,4
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	19,8	30,4	37,6
Suivi actuellement	7,5	33,8	22,0
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*66,1*	*73,3*	*43,2*

4. Produits utilisés

Répartition selon les produits consommés

Produit	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=21917	n=46611	n=54566
Alcool	21,0	39,0	83,9
Tabac	52,5	58,2	59,1
Cannabis	98,6	41,0	15,6
Benzodiazépines	0,6	6,4	1,1
Autres hypnot. et tranquillisants	0,1	1,2	0,2
Héroïne	2,4	49,3	1,9
Autres opiacés	0,2	4,6	0,2
Buprénorphine haut dosage	0,4	11,1	0,3
Méthadone	0,2	9,1	0,2
Cocaïne	6,0	19,9	3,0
Crack	0,4	3,6	0,3
MDMA et dérivés	1,8	3,2	0,4
Amphétamines	0,8	1,8	0,2
Autres stimulants	0,1	0,5	0,1
LSD	1,1	2,2	0,4
Champignons hallucinogènes	0,2	0,2	0,0
Autres hallucinogènes	0,1	2,7	0,2
Colles et solvants	0,4	1,1	0,6
Autres produits	0,4	2,1	0,4
Antidépresseurs	0,1	2,9	0,3
Barbituriques	0,0	1,0	0,1
Pas de produit consommé	4,6	4,3	6,0
Jeux d'argent	0,3	1,4	0,3
Trouble léger du comportement alimentaire	0,1	0,8	0,3
Autre addiction sans produit	0,1	0,7	0,1
Total*	192,5	268,5	175,2
Taux de réponse	*95,4*	*94,8*	*100,0*

*Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits. Les totaux peuvent donc être supérieurs à 100.

Répartition suivant le premier produit consommé

Produit1	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=21503	n=45277	n=50468
Alcool1	0,0	6,8	87,3
Tabac1	0,0	1,9	12,7
Cannabis1	100,0	8,9	0,0
Benzodiazépines1	0,0	2,3	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants1	0,0	0,4	0,0
Héroïne1	0,0	42,6	0,0
Autres opiacés1	0,0	3,2	0,0
Buprénorphine haut dosage1	0,0	7,2	0,0
Méthadone1	0,0	5,1	0,0
Cocaïne1	0,0	6,4	0,0
Crack1	0,0	1,9	0,0
MDMA et dérivés1	0,0	0,8	0,0
Amphétamines1	0,0	0,4	0,0
Autres stimulants1	0,0	0,1	0,0
LSD1	0,0	0,2	0,0
Champignons hallucinogènes1	0,0	0,1	0,0
Autres hallucinogènes1	0,0	0,5	0,0
Colles et solvants1	0,0	0,7	0,0
Autres produits1	0,0	1,4	0,0
Antidépresseurs1	0,0	0,8	0,0
Barbituriques1	0,0	0,4	0,0
Pas de produit consommé1	*3,0*	*4,7*	*3,1*
Jeux d'argent1	0,0	1,3	0,0
Trouble léger du comportement alimentaire1	0,0	0,7	0,0
Autre addiction sans produit1	0,0	0,6	0
Total avec produit1	100,0	94,7	100,0
Taux de réponse1	93,6	92,1	92,5

Répartition suivant le deuxième produit consommé

Produit2	groupe "cannabis" (%) n=9400	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=29131	groupe "alcool" (%) n=25197
Alcool2	36,2	15,8	5,7
Tabac2	47,0	11,1	64,3
Cannabis2	0,0	22,7	19,6
Benzodiazépines2	0,7	3,3	1,4
Autres hypnot. et tranquillisants2	0,1	0,6	0,2
Héroïne2	3,0	8,2	1,2
Autres opiacés2	0,2	1,4	0,2
Buprénorphine haut dosage2	0,3	4,0	0,4
Méthadone2	0,1	4,2	0,3
Cocaïne2	7,1	12,9	1,9
Crack2	0,4	1,5	0,3
MDMA et dérivés2	1,4	1,1	0,1
Amphétamines2	0,6	0,7	0,1
Autres stimulants2	0,1	0,1	0,0
LSD2	0,7	1,0	0,2
Champignons hallucinogènes2	0,1	0,1	0,0
Autres hallucinogènes2	0,1	1,7	0,2
Colles et solvants2	0,6	0,4	1,1
Autres produits2	0,4	0,6	0,4
Antidépresseurs2	0,1	1,9	0,3
Barbituriques2	0,0	0,4	0,1
Pas de produit consommé2	*4,7*	*3,6*	*5,6*
Jeux d'argent2	0,2	0,0	0,1
Trouble léger du comportement alimentaire2	0,1	0,1	0,2
Autre addiction sans produit2	0,1	0,0	0,1
Total avec produit2	99,6	93,9	98,3
Taux de réponse2	40,9	59,3	46,2

Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

Utilisation de la voie intraveineuse	groupe "cannabis" (%) n=14199	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%) n=38399	groupe "alcool" (%) n=35002
Oui, au cours du mois passé	2,1	16,7	2,7
Oui avant (pas dans le mois)	3,9	26,1	3,3
Jamais	94,0	57,2	94,0
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*61,8*	*78,1*	*64,1*

5. Traitements de substitution

Répartition suivant les traitements de substitution

Traitement de substitution	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=.	n=42325	n=.
Non	.	32,1	.
Oui, Méthadone	.	37,7	.
Oui, Buprénorphine haut dosage (BHD)	.	28,3	.
Oui, autre	.	2,0	.
Total	.	100,0	0,0
Taux de réponse	*.*	*86,1*	*.*

.

Répartition suivant la durée des traitements de substitution

Ancienneté du traitement de substitution	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=.	n=12912	n=.
depuis moins de 6 mois	.	15,0	.
de 6 mois à 1 an	.	7,9	.
de 1 an à 2 ans	.	12,1	.
de 2 à 5 ans	.	27,9	.
depuis plus de 5 ans	.	37,0	.
Total		100,0	0,0
Taux de réponse	*.*	*44,9*	*.*

Répartition suivant les autres traitements

Autre traitement	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
Acamprosate	1,4	1,5	18,5
Naltrexone	0,7	0,4	8,7
Antabuse	0,8	0,5	1,2
Substitut nicotiniques	1,3	1,3	3,0
Bupropion	1,3	0,5	0,5
Anxiolytiques	57,5	65,4	66,4
Hypnotiques	21,0	31,6	23,4
Antidépresseurs	43,9	39,4	50,5
Neuroleptiques	36,5	31,5	17,6
Au moins un traitement cité	5,2	18,0	16,0
Aucun traitement cité	92,8	79,6	82,1

6. Sérologies VIH et VHC

Répartition suivant la sérologie VIH

Sérologie VIH	**groupe "cannabis" (%)** n=6893	**groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)** n=27164	**groupe "alcool" (%)** n=33130
Sérologie VIH positive	2,6	5,2	4,2
Sérologie VIH négative	97,4	94,8	95,8
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*30,0*	*55,3*	*60,7*

Répartition suivant la sérologie VHC

Sérologie VHC	**groupe "cannabis" (%)** n=6598	**groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)** n=27212	**groupe "alcool" (%)** n=33041
Sérologie VHC positive	3,6	23,0	5,3
Sérologie VHC négative	96,4	77,0	94,7
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*28,7*	*55,4*	*60,6*

Répartition suivant la vaccination contre l'hépatite B

Sérologie VHB	**groupe "cannabis" (%)** n=8147	**groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)** n=25108	**groupe "alcool" (%)** n=11616
Vaccination VHB Complète	56,1	58,6	46,7
Vaccination VHB Incomplète	43,9	41,4	53,3
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*35,5*	*51,1*	*21,3*

7. Hospitalisation et tentative de suicide

Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=13254	n=34725	n=35098
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	35,0	37,5	22,2
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	65,0	62,5	77,8
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*57,7*	*70,7*	*64,3*

Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie

Nombre d'hospitalisations	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=4276	n=10593	n=6471
une hospitalisation	12,6	24,1	26,9
2 ou 3 hospitalisations	81,5	62,1	61,2
4 hospitalisations et plus	5,9	13,8	11,9
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*92,3*	*81,4*	*82,9*

Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	
	n=11733	n=30900	n=19151
A déjà fait une tentative de suicide	36,5	35,7	32,7
N'a jamais fait de tentatives de suicide	63,5	64,3	67,3
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*51,1*	*62,9*	*35,1*

Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide

Nombre de tentatives de suicide	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=4069	n=9547	n=5645
Une tentative de suicide	23,2	33,1	31,3
Deux ou trois tentative de suicide	72,4	56,2	59,5
Plus de 4 tentative de suicide	4,3	10,7	9,2
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*95,0*	*86,5*	*90,1*

8. Incarcération

Répartition suivant les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=17073	n=38975	n=25501
A déjà été incarcéré	39,3	47,8	40,9
N'a jamais été incarcéré	60,7	52,2	59,1
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*74,4*	*79,3*	*46,7*

Répartition suivant le nombre d'incarcérations

Nombre d'incarcérations	groupe "cannabis" (%)	groupe "opiacés, cocaïne et autres substances" (%)	groupe "alcool" (%)
	n=3287	n=11206	n=5488
Une incarcération	44,3	37,5	43,5
Deux ou trois incarcérations	25,0	26,9	27,2
Quatre incarcérations et plus	30,7	35,6	29,2
Total	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*48,9*	*60,2*	*52,7*

9. Tableaux complémentaires

Répartition suivant le premier produit consommé du mode de consommation habituel parmi les personnes du groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Produit1	Injecté (%)	Fumé/inhalé (%)	Mangé/bu (%)	Sniffé (%)	Autre (%)	Total utile	NSP/NR (%)
Alcool1 (n=3092)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Tabac1 (n=869)	0,0	99,0	0,7	0,0	0,2	100,0	7,2
Cannabis1 (n=3661)	0,0	98,8	0,9	0,0	0,3	100,0	9,3
Benzodiazépines1 (n=1059)	1,7	0,0	93,0	1,2	4,1	100,0	14,7
Autres hypnot. et tranquillisants1 (n=165)	3,0	0,0	87,3	8,5	1,2	100,0	10,3
Antidépresseurs1 (n=271)	13,3	0,0	42,1	43,5	1,1	100,0	22,1
Barbituriques1 (n=91)	2,2	0,0	94,5	1,1	2,2	100,0	50,5
Héroïne1 (n=17711)	21,0	19,7	0,7	57,9	0,7	100,0	8,2
Autres opiacés1 (n=1287)	45,0	3,1	44,7	4,7	2,5	100,0	9,8
Buprénorphine haut dosage1 (n=2896)	30,5	13,4	29,7	24,1	2,3	100,0	10,6
Méthadone1 (n=2076)	0,9	42,5	54,3	0,6	1,6	100,0	10,7
Cocaïne1 (n=2563)	17,7	14,9	0,9	66,0	0,5	100,0	11,0
Crack1 (n=786)	1,8	94,1	2,7	1,0	0,4	100,0	7,0
MDMA et dérivés1 (n=280)	10,7	13,9	48,6	26,4	0,4	100,0	25,3
Amphétamines1 (n=174)	24,7	6,9	50,6	17,2	0,6	100,0	11,2
Autres stimulants1 (n=32)	25,0	9,4	40,6	25,0	0,0	100,0	11,1
LSD1 (n=74)	6,8	9,5	66,2	9,5	8,1	100,0	26,7
Champignons hallucinogènes1 (n=9)	0,0	55,6	44,4	0,0	0,0	100,0	70,0
Autres hallucinogènes1 (n=65)	3,1	15,4	9,2	9,2	63,1	100,0	71,5
Colles ou solvant1 (n=271)	0,0	91,9	2,2	3,7	2,2	100,0	9,4
Autres produits1 (n=404)	5,9	18,1	35,6	5,9	34,4	100,0	38,0

Répartition suivant le premier produit consommé du type d'usage parmi les personnes du groupe opiacés, cocaïne et autres substances

Produit1	Usage à risque (%)	Usage nocif (%)	Dépendance (%)	Total utile	NSP/NR (%)
Alcool1 (n=2727)	10,2	17,8	72,0	100,0	11,8
Tabac1 (n=781)	3,5	5,0	91,5	100,0	10,1
Cannabis1 (n=3503)	20,0	26,2	53,8	100,0	13,2
Benzodiazépines1 (n=878)	6,8	9,8	83,4	100,0	17,1
Autres hypnot. et tranquillisants1 (n=144)	12,5	14,6	72,9	100,0	21,7
Antidépresseurs1 (n=291)	13,4	16,8	69,8	100,0	16,4
Barbituriques1 (n=146)	6,2	13,7	80,1	100,0	20,7
Héroïne1 (n=14702)	5,7	5,6	88,7	100,0	23,8
Autres opiacés1 (n=1221)	3,4	6,1	90,6	100,0	14,4
Buprénorphine haut dosage1 (n=2563)	6,7	7,2	86,1	100,0	20,9
Méthadone1 (n=1725)	13,7	9,3	77,0	100,0	25,8
Cocaïne1 (n=2244)	17,8	26,2	56,1	100,0	22,1
Crack1 (n=724)	10,5	19,1	70,4	100,0	14,3
MDMA et dérivés1 (n=157)	26,1	33,8	40,1	100,0	58,1
Amphétamines1 (n=161)	17,4	25,5	57,1	100,0	17,9
Autres stimulants1 (n=32)	18,8	31,3	50,0	100,0	11,1
LSD1 (n=63)	20,6	33,3	46,0	100,0	37,6
Champignons hallucinogènes1 (n=10)	20,0	20,0	60,0	100,0	66,7
Autres hallucinogènes1 (n=261)	10,0	12,5	77,5	100,0	82,5
Colles ou solvant1 (n=347)	7,3	6,1	86,6	100,0	12,7
Autres produits1 (n=499)	13,3	15,3	71,5	100,0	46,8

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSAPA en 2012 suivant le sexe et les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	groupe alcool (%)		groupe opiacés cocaïne et autres substances (%)		groupe cannabis (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	20,6	27,8	35,8	43,4	34,1	40,0
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)	79,4	72,2	64,2	56,6	65,9	60,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*64,9*	*62,4*	*70,5*	*71,3*	57,6	58,3

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSAPA en 2012 suivant le sexe et les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	groupe alcool (%)		groupe opiacés cocaïne et autres substances (%)		groupe cannabis (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà fait une tentative de suicide	32,4	46,1	33,1	45,9	35,6	43,8
N'a jamais fait de tentatives de suicide	67,6	53,9	66,9	54,1	64,4	56,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*36,7*	*36,7*	*63,2*	*63,0*	51,3	51,4

Répartition des patients vus en ambulatoire dans les CSAPA en 2012 suivant le sexe et les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	groupe alcool (%)		groupe opiacés cocaïne et autres substances (%)		groupe cannabis (%)	
	hommes	femmes	hommes	femmes	hommes	femmes
A déjà été incarcéré	46,6	19,2	52,5	30,9	41,9	22,6
N'a jamais été incarcéré	53,4	80,8	47,5	69,1	58,1	77,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	*48,2*	*42,0*	*80,1*	*76,4*	75,1	70,0

Prévalence déclarée du VIH et du VHC parmi les personnes ayant déjà utilisé de la voie intraveineuse (actuellement ou auparavant)

Sérologie	groupe opiacés cocaïne et autres substances (%)	
	VIH n=11106	VHC n=11390
Sérologie positive déclarée	7,9	43,8
Sérologie négative déclarée	92,1	56,2
Total	100,0	100,0
Taux de réponse	*70,5*	*72,3*