




Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

**Thématique :** Offre

**Substance considérée :** Tabac

# Ventes de traitements pour l'arrêt du tabac Évolution depuis 1998



## Constat

En quelques années, le nombre d'« équivalents patients traités » pour l'arrêt du tabac est passé de 500 000 en 1998 à plus de 2 millions en 2003 et 2004. Ce nombre semble ensuite fluctuer entre 1,5 millions et un peu plus de 2 millions.

En 2018, les ventes de traitements pour l'arrêt du tabac réalisées en pharmacie augmentent sensiblement pour la quatrième année consécutive : on compte 3 413 896 « patients traités » contre 2 726 417 en 2017, soit un quart de plus. Pour la première fois, le nombre de patients traités estimé atteint et dépasse même la barre des trois millions de personnes.

Les ventes de timbres transdermiques ont enregistré une forte hausse en 2000, après l'annonce de

leur délistage<sup>(1)</sup> en décembre 1999, suivie d'une autre en 2003 (+ 50 %), liée aux augmentations des prix du tabac intervenues en octobre 2003 et janvier 2004. Les ventes de timbres ont ensuite été divisées par deux au profit des ventes de substituts nicotiniques sous formes orales qui ont progressé, entre 2002 et 2012, à un rythme constant. En 2018, les ventes de substituts nicotiniques ont progressé de 23 % et les patches représentent maintenant plus de la moitié d'entre elles (contre 42 % en 2017).

En 2018, le Zyban<sup>®(2)</sup> voit de nouveau ses ventes diminuer (- 6 %) alors que les ventes de Champix<sup>®</sup>, qui avaient été divisées par 11 entre 2007 (lancement du médicament) et 2015, ont été multipliées par quatre par rapport à 2016.

## Remarques méthodologiques

Les données brutes de ventes correspondent aux ventes aux officines par les grossistes répartiteurs, les dépositaires et les laboratoires et sont proches des ventes au public (peu de stock). Les produits distribués dans les hôpitaux ne sont en revanche pas pris en compte.

Les ventes par unité sont transformées en équivalent du nombre de patients traités, selon l'hypothèse suivante : 1 fumeur prend en moyenne un mois de traitement, à raison de 2 comprimés de Zyban<sup>®</sup> ou de Champix<sup>®</sup> ou 1 timbre ou 10 formes orales par jour (estimation OFT).

(1) Depuis le 5 décembre 1999, tous les produits contenant de la nicotine et destinés au sevrage tabagique peuvent être achetés sans ordonnance dans les pharmacies.

(2) Le Zyban<sup>®</sup> (nom commercial pour le bupropion chlorhydrate) est un antidépresseur utilisé dans le cadre de la désintoxication tabagique.

## Liens

Tableau de bord mensuel des indicateurs relatifs au tabac et bilan 2018 :

<https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/>

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : juin 2019