



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

Type de source : Enquête en population générale

Type de substance considéré : Tabac

Population concernée : Population générale

Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV)

Accès rapides :

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Diffusion](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

Organisation et financement

[haut du document](#)

Maître d'oeuvre

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Responsable

Danièle Guillemot - Division Conditions de vie des ménages (INSEE) - 18, bd Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex

Financement et collaboration

Objectifs

[haut du document](#)

Étudier les actions et pratiques de santé des individus dans leur vie quotidienne.

Méthodologie

[haut du document](#)

Périodicité

Annuelle

Dates d'observation

De 1996 à 2004

Enquête particulière en mai 2001 spécifiques aux « Comportements vis-à-vis de la santé »

Approche

Quantitative

Unité statistique

Individu

Champ d'observation

Population générale âgée de 15 ans et plus

Méthode d'échantillonnage

Durée d'observation

Le dispositif d'Enquêtes permanentes des conditions de vie (EPCV) comprend trois parties (tableau de composition du ménage, indicateurs sociaux, partie variable) et donne lieu à trois enquêtes par an (une en janvier, une en mai, la dernière en octobre)

Les ménages contactés sont interrogés deux fois, sur deux années à la même période (exemple : ceux vus en janvier 2003, seront revus en janvier 2004, ceux de mai 2003, en mai 2004 et ainsi de suite).

Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation

Champ géographique

France métropolitaine

Découpage géographique possible

Champ toxicologique

Définition toxicologique retenue ou nomenclature

Pour le tabac (enquête « comportements vis-à-vis de la santé » de 2001) :

- fumeurs quotidiens ou fumeurs actuels : fumer au moins une cigarette par jour au moment de l'enquête
- anciens fumeurs : ne pas fumer quotidiennement au moment de l'enquête mais avoir fumé

- quotidiennement dans le passé (peuvent déclarer un tabagisme actuel occasionnel)
- non-fumeurs : anciens fumeurs et personnes n'ayant jamais fumé quotidiennement
 - consommation de tabac : nombre de cigarettes fumées quotidiennement

Nombre d'unités statistiques observées

Environ 11 000 individus en 2001 dont 5 200 individus pour l'enquête « comportements vis-à-vis de la santé ».

Taux de couverture

Recueil de données

En face à face, sur ordinateur (système Capi)

Données recueillies

Questions spécifiques au tabac (dans la partie fixe "indicateurs sociaux") :

- usage de tabac
- quantités consommées (nombre de cigarettes fumées par jour, données en tranches)

Questions spécifiques au tabac (dans l'enquête « comportements vis-à-vis de la santé », partie variable de l'enquête de mai 2001) :

Pour les fumeurs :

- âge du début de la consommation
- tentative d'arrêt
- recours à des aides pour l'arrêt (patch...)
- ancienneté
- envie d'arrêter de fumer
- fumer dans le logement

Pour les non-fumeurs :

- antécédent par rapport au tabac
- présence de fumeur dans le logement

Si ancien fumeur :

- âge de début de la consommation
- quantité
- ancienneté de l'arrêt
- recours à des aides pour l'arrêt (patch...)

Chaque enquête comprend deux parties :

- la première dite « indicateurs sociaux », est destinée à appréhender et mesurer régulièrement certains aspects de la vie des ménages : qualité de l'habitat et de l'environnement (enquête de janvier), problèmes de santé, difficultés financières et de logement et consommation (enquête de mai), environnement de travail, contacts sociaux et loisirs (enquête d'octobre)
- la seconde partie, dite « variable », est destinée à appréhender ponctuellement tel ou tel problème social selon les priorités du moment.

Ces deux parties s'articulent autour d'une partie commune : caractéristiques socio-démographiques des individus du ménage et leurs revenus.

Qualité et fiabilité des données

S'agissant d'une enquête déclarative, une sous-estimation de l'usage et des quantités individuelles fumées n'est pas à exclure.

Diffusion

[haut du document](#)

Délai de diffusion des résultats

Principal mode de diffusion des résultats

Article (Insee première)

Bibliographie

- Aliaga C., « Les femmes plus attentives à leur santé que les hommes », Insee première, 2002, n°869, 4 p.
- Aliaga C., « Les relations au tabac sont multiples », Insee première, 2002, n°852, 4 p.
- Aliaga C., « Le tabac : vingt ans d'usage et de consommation », Insee première, 2001, n°808, 4 p.

Observations

[haut du document](#)

L'enquête a reçu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, a été reconnue d'intérêt général et est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Pour en savoir plus

[haut du document](#)

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : mai 2014