



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

Type de source : Enquête en population générale

Type de substance considéré : Alcool

Population concernée : Population générale

Enquête Événements de vie et santé (EVS) - alcool

Accès rapides :

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Diffusion](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

Organisation et financement

[haut du document](#)

Maître d'oeuvre

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES - Ministère de la Santé)

Responsable

Catherine Cavalin - DREES - 14 Avenue Duquesne - 75350 Paris 07

Financement et collaboration

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Objectifs

[haut du document](#)

Objectif principal : mieux connaître les phénomènes de violences ressentis et leur implication, notamment en matière de santé.

Objectif secondaire : établir un lien entre les violences subies et les consommations de substances psychoactives licites et illicites.

Méthodologie

[haut du document](#)

Périodicité

Non connue à l'avance

Dates d'observation

2005-2006

Approche

Quantitative

Unité statistique

Individu

Champ d'observation

Population générale âgée de 18 à 75 ans.

Méthode d'échantillonnage

Tirage au sort de 10 000 répondants dans l'échantillon-maître de l'Insee (recensement 1999) et dans la base de sondage des logements neufs (BDSL), avec une extension constituée dans la base de sondage spécifique aux zones urbaines sensibles (ZUS). Personnes résidant dans un ménage ordinaire, âgées de 18 à 75 ans, avec une surreprésentation des 18-25 ans.

Durée d'observation

4 mois (novembre 2005 - février 2006)

Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation

Sont exclus les ménages collectifs et ceux ne disposant pas d'un lieu de résidence.

Champ géographique

France métropolitaine (+ quelques entretiens en Corse)

Découpage géographique possible

Aucun

Champ toxicologique

Substances psychoactives licites (alcool et tabac) et illicites (cannabis, produits à inhaler, amphétamines, cocaïne, LSD, crack, héroïne, ecstasy, etc.).

Définition toxicologique retenue ou nomenclature

Consommation régulière = au moins 2 ou 3 fois par semaine.

Binge drinking : avoir bu au moins 6 verres d'alcool au cours d'une même occasion.

Usage problématique: test DETA (2 réponses positives sur les 4 questions).

Nombre d'unités statistiques observées

9 953 répondants de 18-75 ans en face à face dont 9 538 ont aussi répondu au questionnaire auto-administré sur les consommations de substances psychoactives.

Taux de couverture

73 %

Recueil de données

Enquêteurs professionnels de l'INSEE par entretien en face à face et par audio-CASI)

Données recueillies

L'entretien en face à face est construit autour de six modules :

- le TCM (tableau de composition du ménage)
- le module "santé" : santé perçue, maladies chroniques, handicaps, traumatologie, tabagisme, etc.
- le module biographique : biographie professionnelle et familiale, événements difficiles...
- le module «violence subie au cours des 24 derniers mois" (vols ; cambriolages ; violences verbales ; physiques ; sexuelles ; morales et psychologiques).
- le module "violence subie au cours de la vie entière".
- un module conclusif avec des questions ouvertes si l'enquêté souhaite ajouter des éléments.

Le questionnaire auto-administré par ordinateur avec interface audio comprend quatre modules:

- le module "comportements sexuels" : âge au premier rapport, nombre de partenaires, contraception, IVG, dépistages VIH et IST.
- le module "consommation d'alcool" : consommation au cours de la vie par la combinaison des tests DETA et AUDIT.
- le module "consommation de drogues illicites" : consommation au cours de la vie de substances psychoactives illicites (cannabis, cocaïne, ecstasy, amphétamines, etc.) et âge d'expérimentation.
- des questions de "rattrapage" sur les attouchements et rapports sexuels forcés" pour réimputer ces éléments aux enquêtés qui n'avaient pas souhaité répondre à ces questions en face à face.

Qualité et fiabilité des données

Nombreuses vérifications quant à la représentativité des échantillons, la cohérence des réponses, etc. Pondération et calage sur marges par la méthode Calmar de l'INSEE.

Diffusion

[haut du document](#)

Délai de diffusion des résultats

Premiers résultats : n+18 mois

Publication : n+ 4 ans

Principal mode de diffusion des résultats

Rapport

Bibliographie

- Beck F., Cavalin C., Maillochon F; (sous la direction de), "Violences et santé en France : état des lieux", Paris, La documentation Française, 2010, 274 p.

Observations

[haut du document](#)

Pour en savoir plus

[haut du document](#)

Consulter le rapport

<http://www.sante.gouv.fr/violences-et-sante-en-France-etat-des-lieux.html>

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : décembre 2016