



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

**Type de source :** Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales

**Type de substance considéré :** Alcool

**Population concernée :** Population particulière/professionnels

# Baromètre santé médecins-pharmaciens - alcool

## Accès rapides :

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Diffusion](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

## Organisation et financement

[haut du document](#)

### Maître d'oeuvre

Santé publique France (ex-Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES))

### Responsable

Arnaud Gautier - Santé publique France - 42, bd de la Libération - 93203 Saint Denis Cedex

### Financement et collaboration

Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)  
Unité UMRS 1018 (Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM))  
Institut de veille sanitaire (InVS)  
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)  
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les addictions (MILD&CA)  
Observatoire régional de la santé de Franche-Comté  
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Conseil national de l'ordre des médecins  
Institut GfK-ISL

## Objectifs

[haut du document](#)

Objectifs généraux :

- Connaître les attitudes et comportements de santé et de prévention des médecins généralistes afin de dégager des enseignements utiles en matière de santé publique et d'éducation à la santé
- Connaître les opinions et les attitudes des pharmaciens en matière de prévention, mettre en relation leurs pratiques personnelles avec leurs attitudes vis-à-vis de la clientèle.

Objectifs du module "alcool et tabac" : connaître l'importance de la prise en charge de l'alcoolisme et du tabagisme par les médecins généralistes et les pharmaciens et les outils de dépistage utilisés.

## Méthodologie

[haut du document](#)

### Périodicité

Variable

### Dates d'observation

Baromètre santé médecins généralistes : 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2009  
Enquête auprès des pharmaciens : 1998, 2003

### Approche

Quantitative

### Unité statistique

Individu

### Champ d'observation

Médecins généralistes exerçant une activité libérale.  
Pharmaciens titulaires d'une officine.

### Méthode d'échantillonnage

Tirage aléatoire à partir du fichier Cegedim® des médecins généralistes libéraux et du fichier téléphonique des pharmaciens titulaires d'officine.

### Durée d'observation

11 semaines (novembre 2008 - janvier 2009)

## **Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation**

Les médecins et pharmaciens qui ne font pas partie du fichier Cegedim® / fichier téléphonique, ceux injoignables (malgré les relances), absents de longue durée ou ayant déménagé n'ont pu être enquêtés.

### **Champ géographique**

France métropolitaine

### **Découpage géographique possible**

Région

### **Champ toxicologique**

Tabac, alcool et drogues illicites

### **Définition toxicologique retenue ou nomenclature**

Le terme "alcoolisme" est utilisé pour parler des usages à problème (ou des consommations excessives d'alcool) dans la mesure où il correspond à l'intitulé de la question posée.

### **Nombre d'unités statistiques observées**

Médecins généralistes : 2 083 en 2009

Pharmaciens : 1 062 en 2003

### **Taux de couverture**

1 médecin sur 30 et 1 pharmacien sur 26

Taux de refus : 30,9 % pour les médecins en 2009 et 9 % pour les pharmaciens en 2006.

### **Recueil de données**

Enquêteurs professionnels par téléphone et utilisation du système CATI

### **Données recueillies**

Questionnaire médecins 2009

Questions relatives à l'alcool :

- utilisation d'outils d'aide au repérage de facteurs de risque dans le domaine de l'alcool
- mode de prise en charge (seul ou en liaison avec une structure spécialisée)
- nombre de patients vus au cours des 7 derniers jours pour un sevrage alcoolique

Autres questions :

- signalétique du médecin
- pratique médicale et opinions : vaccination, VIH, hépatite C et IST, dépistage des cancers, prévention et éducation du patient, prescription de médicaments et visites, prise en charge des problèmes d'addiction (tabac, alcool, drogues illicites), accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Questionnaire pharmaciens 2003

Questions relatives à l'alcool :

- occasions de parler de la consommation d'alcool des clients
- participation à un réseau de soins
- perception de l'importance du rôle du pharmacien concernant l'alcoolisme
- fréquence et type de boissons alcoolisées consommées par le pharmacien

Autres questions :

- signalétique du pharmacien
- comportements personnels de santé : consommation de tabac, alcool, médicaments psychotropes, vaccination, dépistage du VIH et du VHC, utilisation du préservatif
- pratique et opinions relatives à : vaccination, consommation de tabac et d'alcool, suivi des personnes séropositives ou diabétiques, dépistage des cancers, contraceptifs oraux, confidentialité, distribution de médicaments
- activité professionnelle et opinions (travail en réseau, formation, rôle du pharmacien, satisfaction...)

## Qualité et fiabilité des données

Bonne. Le recueil des données par téléphone assisté par le système CATI permet un contrôle direct et étroit de la qualité de travail des enquêteurs : appréciation de la formulation des questions et de la codification des réponses, analyse en temps réel des difficultés rencontrées et réflexion méthodologique plus approfondie.

## Diffusion

[haut du document](#)

### Délai de diffusion des résultats

n + 24 mois

### Principal mode de diffusion des résultats

Rapport

## Bibliographie

- Gautier A. (dir.), "Baromètre santé médecins généralistes 2009", Saint-Denis, Inpes, coll. Baromètres santé, 2011, 266 p.
- Gautier A. (dir.), "Baromètre Santé médecins/pharmaciens 2003", Saint-Denis, INPES, 2005, 271 p.

## Observations

[haut du document](#)

- En 2003, l'enquête « Baromètre santé médecins généralistes » et l'enquête auprès des pharmaciens d'officine ont été fusionnées.
- Lorsque cela était possible, la formulation des questions est la même pour les deux populations, afin d'autoriser des comparaisons.
- L'enquête auprès des pharmaciens n'a pas été reconduite en 2009 : les derniers résultats pour cette population datent donc de 2003.

## Pour en savoir plus

[haut du document](#)

[Baromètre santé Médecins généralistes 2009](#)

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : novembre 2018