




Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.


**Thématique :** Problèmes de santé et mortalité

**Substance considérée :** Tabac

# Évolution du nombre de décès liés au tabac et des ventes de tabac en France depuis 1980



Évolution du nombre de décès par cancer du poumon, des bronches, de la trachée et du larynx en France chez les hommes et chez les femmes (1980 – 2015)



Source : INSERM-CépiDc

## Constat

La courbe des décès liés au tabac suit avec 10 à 20 ans de retard celle des ventes de tabac.

En 2010, on estime que 47 000 décès annuels par cancer seraient consécutifs au tabac, dont environ 28 000 cancers du poumon. Le tabac causerait aussi 20 000 décès par maladies cardio-vasculaires et 11 000 décès par maladie respiratoire (notamment la bronchite chronique obstructive) et autres pathologies.

Concernant les cancers des voies respiratoires (poumon, bronches, trachée et larynx), en très grande partie liés au tabagisme, leur nombre a augmenté par rapport au début des années 1980 mais l'évolution diffère selon le sexe. Chez les hommes, la hausse s'est opérée jusqu'au milieu des années 1990 avant d'atteindre une relative stabilité autour de 23 000 décès ; chez les femmes, cette augmentation a été continue et régulière, la mortalité ayant été multipliée par 4 en 35 ans. Ainsi, l'écart entre les hommes et les femmes s'est nettement réduit, passant d'une mort féminine pour 10 morts masculines en 1980 à 1 pour 2,5 en 2015.

## Remarques méthodologiques

La mortalité attribuable au tabac est calculée à partir des décès enregistrés dans le registre du CépiDc de l'INSERM et des fractions attribuables (au tabac) pour une liste de pathologies dont le risque est accru par le tabagisme, établies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS/WHO).

## Liens utiles

Peto, R., A. D. Lopez, et al. (2004). Mortality from smoking in developed countries 1950-2000, CTSU (University of Oxford). <http://www.ctsu.ox.ac.uk/research/mega-studies/mortality-from-smoking-in-developed-countries-1950-2010/mortality-from-smoking-in-developed-countries-1950-2010>

- World Health Organization. WHO global report: mortality attributable to tobacco, Genève, 2012 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241564434\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241564434_eng.pdf))

- Ribassin-Majed L., Hill C., "Trends in tobacco-attributable mortality in France", The European Journal of Public Health, 2015, pp.1-5 (first published online: 9 May 2015)

- Bonaldi C. *et al.*, « Les décès attribuables au tabagisme en France. Dernières estimations et tendance, années 2000 à 2013 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2016, Saint-Maurice, pp.528-540.

- Site du CépiDc : <http://www.cepidc.inserm.fr/site4/>

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : mars 2018